

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

RESOLUCIÓN No. 0195 DEL 04 DE MARZO DE 2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL.

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, en uso de sus facultades legales y estatutarias especialmente las contenidas en la ley 99 de 1993 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO

Que el señor DIEGO ARMANDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.201.971, Representante Legal del CONSORCIO CONSTRU VÍAS, identificado NIT 901.715.685-2, acreditado ante esta Corporación mediante radicado CSB No. 264 del 30 de enero de 2024 los requisitos correspondientes al Permiso de Aprovechamiento Forestal para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DPTO. DE BOLÍVAR".

Que Mediante Auto No. 0100 del 30 de enero de 2024, emitido por esta Corporación se dio inicio al trámite de la solicitud de Aprovechamiento Forestal, notificado mediante aviso No. 141 del 21 de febrero de 2024 al correo electrónico ingdanielallorete@gmail.com.

Que mediante oficio interno No. SG-INT 0295 del 31 de enero de 2024, se remitió a Subdirección de Gestión Ambiental con el fin de que realice la respectiva evaluación, visita ocular y emita el Concepto Técnico.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Concepto Técnico No. 088 del 04 de marzo de 2024 el cual establece lo siguiente:

"ANTECEDENTES

Que el señor Diego Armando Álvarez Hernández identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representate legal del CONSORCIO CONSTRU VÍAS identificado con NIT 901715.685-2, acreditado ante esta Corporación mediante radicado No 264 del 30 de enero de 2024 los requisitos correspondientes al permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para el proyecto denominado "Mejoramiento en concreto Asfáltico de la vía que conduce desde el corregimiento de Rio Viejo Hasta el municipio de Tiquisio, Departamento de Bolívar

Por lo cual se establece el auto No 0100 del 30 de enero de 2024, por medio del cual se inicia trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se requiere remitir la presente actuación a la Subdirección de Gestión Ambiental para que realice la respectiva visita de inspección ocular, evalúe la solicitud y emita el respectivo concepto técnico.

De lo anterior establecido se emite el OF INT No 0295, por medio del cual hace remisión de información a la Subdirección de Gestión Ambiental el subdirector de Gestión Ambiental, para que realice la respectiva visita de inspección ocular y verifique los hechos indicados por el solicitante.


En virtud de lo anterior el subdirector de Gestión Ambiental de la CSB, comisiona a los suscritos, para atender el asunto arriba señalado y emitir el respectivo concepto técnico.

UBICACIÓN DE LA SOLICITUD.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General



Mapa 1: Ubicación de los árboles inventariados en el Terreno entregado por parte del Usuario

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

El día 23 de febrero, nos desplazamos al municipio de Rio Viejo Bolívar a realizar visita de inspección ocular en la vía que del municipio de Rio Viejo conduce al municipio de Tiquisio Bolívar, donde nos atendió el ingeniero auxiliar de la obra el señor Jean Carlos Cervantes identificado con cedula N°1.065.817.303 el trayecto que contempla el proyecto son 20 kilómetros de concreto Asfáltico una vez en el lugar, se registró la información de georreferenciación con un Navegador GPS Garmin 64sx desde las coordenadas Punto No1 inicio de la obra: N 8.5940, W 73.8521 y Punto No 2 Final: N 8.6006, W 74.0163, donde se finalizó el recorrido de los árboles inventariados y según lo manifestado por el ingeniero de la obra que se está realizando el manifiesta que es necesaria la intervención de estos árboles ubicados en predio de dominio público a lo largo de la vía desde el municipio de rio viejo hasta el Kilómetro 20 de la vía que conduce al municipio de Tiquisio Bolívar y representan un obstáculo para la ampliación y adecuación de la vía en mención, por lo tanto se requiere la autorización para el aprovechamiento forestal de estas especies para poder comenzar con la adecuación del terreno.

Pudiendo realizar la medición al azar del 10% del total de los individuos donde se identificó las coordenadas, altura, Diámetro y por último su estado fitosanitario. Sin dejar de lado la correcta identificación dendrológica de los individuos 195 individuos verificados en campo.

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD.

Inventario Forestal

Características Físicas Generales

Con el fin de identificar los individuos objeto de estudio y corroborar la información plasmada en el inventario forestal se procedió a realizar la tabulación de los individuos medidos en campo. En este caso particular correspondiente a la medición del 10% del total de los establecidos dentro del inventario forestal. En donde se procedió a realizar la verificación de la información entregada.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
NIT. 806.000.327 – 7
Secretaría General

Luego de esto se procedió a realizar la cubicación volumétrica de los individuos verificados ya que se determinó en campo la altura comercial (hf), altura total (ht), evaluar las características físicas, estado sanitario, entre otras, se verificó que el cálculo del área basal (AB) y el volumen (V) aproximado se obtuvo aplicando las siguientes fórmulas.

$$AB = \frac{\pi}{4} \cdot DAP^2$$

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot DAP^2 \cdot ht \cdot ff$$

Dónde:
DAP= Diámetro a la altura del pecho (1,30 m)
ht= Altura total (m)
ff= Factor forma (0.6)

Tabla 1: Verificación de árboles a aprovechar en la vía que del municipio de Rio Viejo conduce al municipio de Tiquisio Bolívar.

VERIFICACION DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA VIA DESDE EL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR																
N°	ID	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ALT COM	ALT TOT	CAP m	DAP m	DAP^2	RADIO	RADIO^2	AREA BASAL	FACT FORM	VOL MAD Mt3	VOL COP Mt3	VOL COM Mt3	VOL TOTAL Mt3
1	1	Higo amarillo	Albizia quachepele	9,00	12,00	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,06	0,62	1,24
2	2	Mora	Maclura tinctoria	11,25	15,00	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,89	0,09	0,89	1,79
3	3	Roble	Tabebuia rosea	13,50	18,00	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,58	0,26	2,58	5,16
4	14	Ceiba Tolua	Pachira quinata	11,25	15,00	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,50	0,15	1,50	3,00
5	15	Ceiba Tolua	Pachira quinata	9,75	13,00	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	5,70	0,57	5,70	11,41
6	16	Roble	Tabebuia rosea	11,25	15,00	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,50	0,15	1,50	3,00
7	17	Mora	Maclura tinctoria	9,00	12,00	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,69	0,07	0,69	1,39
8	18	Ceiba Tolua	Pachira quinata	12,00	16,00	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	5,16	0,52	5,16	10,31
9	19	Campano	Samanea saman	9,00	12,00	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,01	0,15	0,30
10	88	Guacamayo	Triplaris americana	11,25	15,00	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,09	0,01	0,09	0,17
11	89	Mora	Maclura tinctoria	9,00	12,00	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,02	0,15	0,31
12	90	Mora	Maclura tinctoria	6,00	8,00	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,01	0,07	0,14
13	102	Ceiba Tolua	Pachira quinata	9,00	12,00	1,62	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,13	0,11	1,13	2,26
14	103	Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,25	7,00	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,01	0,12	0,23
15	104	Mora	Maclura tinctoria	9,00	12,00	1,96	0,62	0,39	0,31	0,10	0,31	0,60	1,65	0,17	1,65	3,30
16	105	Mora	Maclura tinctoria	9,75	13,00	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,69	0,07	0,69	1,39
17	106	Campano	Samanea saman	10,50	14,00	1,41	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,00	0,10	1,00	1,99
18	107	Mora	Maclura tinctoria	12,00	16,00	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,47	0,15	1,47	2,93
19	108	Teca	Tectona grandis	7,50	10,00	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,32	0,03	0,32	0,63
20	109	Orejero	cyclocarpum	15,00	20,00	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	8,77	0,88	8,77	17,55
21	110	Mora	Maclura tinctoria	9,75	13,00	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,05	0,10	1,05	2,09
22	111	Guacamayo	Triplaris americana	3,00	4,00	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,01	0,06	0,12
23	112	Mora	Maclura tinctoria	7,50	10,00	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,08	0,81	1,61
24	113	Mora	Maclura tinctoria	6,00	8,00	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,02	0,18	0,37
25	114	Mora	Maclura tinctoria	7,50	10,00	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,03	0,29	0,58
26	115	Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,75	5,00	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,14	0,01	0,14	0,28
27	116	Jobo	Pithecellobim dulce	7,50	10,00	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,02	0,21	0,42
28	117	Jobo	Pithecellobim dulce	8,25	11,00	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,03	0,28	0,57
29	118	Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,75	9,00	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,53	0,05	0,53	1,06
30	119	Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,50	10,00	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,35	0,04	0,35	0,70
31	120	Mora	Maclura tinctoria	6,00	8,00	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,03	0,28	0,56
32	121	Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,75	5,00	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,07	0,01	0,07	0,13
33	122	Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,50	6,00	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,01	0,08	0,17
34	123	Campano	Samanea saman	7,50	10,00	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,00	0,10	1,00	2,00
35	124	Mora	Maclura tinctoria	7,50	10,00	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	1,89	0,19	1,89	3,79
36	125	Mora	Maclura tinctoria	15,00	20,00	1,47	0,47	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,55	0,15	1,55	3,10
37	126	Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,50	10,00	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,52	0,05	0,52	1,03
38	127	Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,50	6,00	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,02	0,17	0,35
39	128	Mora	Maclura tinctoria	4,50	6,00	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,01	0,07	0,13

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

40	129	Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	12,75	17,00	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,60	0,06	0,60	1,19
41	130	Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	12,75	17,00	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,56	0,16	1,56	3,12
42	131	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	12,00	16,00	1,84	0,59	0,34	0,29	0,09	0,27	0,60	1,94	0,19	1,94	3,88
43	132	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44	133	Teca	<i>Tectona grandis</i>	9,75	13,00	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,63	0,06	0,63	1,25
45	134	Suan	<i>Ficus dendrocida</i>	7,50	10,00	3,40	1,08	1,17	0,54	0,29	0,92	0,60	4,14	0,41	4,14	8,28
46	135	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	7,50	10,00	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,02	0,20	0,40
47	136	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
48	137	Espino	<i>Crataegus mongyna</i>	9,00	12,00	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,05	0,46	0,93
49	138	Espino	<i>Crataegus mongyna</i>	11,25	15,00	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,70	0,07	0,70	1,40
50	139	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,75	5,00	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,00	0,03	0,06
51	140	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	5,25	7,00	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,00	0,04	0,08
52	141	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	142	Espino	<i>Crataegus mongyna</i>	4,50	6,00	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,00	0,03	0,06
54	143	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	5,25	7,00	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,00	0,04	0,08
55	144	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,00	8,00	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,01	0,08	0,16
56	145	Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,50	10,00	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,04	0,40	0,80
57	146	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	4,50	6,00	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,01	0,08	0,17
58	147	olla de mono	<i>Icelythis lanceolata</i>	4,50	6,00	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,55	0,06	0,55	1,10
59	148	Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,50	10,00	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,08	0,81	1,61
60	149	Teca	<i>Tectona grandis</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	150	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,50	6,00	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,01	0,08	0,17
62	151	olla de mono	<i>Icelythis lanceolata</i>	3,75	5,00	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,01	0,06	0,12
63	152	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64	153	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	5,25	7,00	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,02	0,23	0,45
65	154	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,00	8,00	1,85	0,59	0,35	0,29	0,09	0,27	0,60	0,98	0,10	0,98	1,96
66	155	olla de mono	<i>Icelythis lanceolata</i>	7,50	10,00	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,01	0,05	0,10
67	156	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,00	8,00	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,03	0,33	0,67
68	157	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	4,50	6,00	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,01	0,07	0,15
69	158	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,75	5,00	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,22	0,02	0,22	0,43
70	159	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	7,50	10,00	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,53	0,05	0,53	1,07
71	160	Campano	<i>Samanea saman</i>	11,25	15,00	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,41	0,04	0,41	0,81
72	161	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,75	9,00	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,01	0,11	0,22
73	162	Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	18,75	25,00	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	2,50	0,25	2,50	4,99
74	163	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,50	6,00	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,35	0,04	0,35	0,70
75	164	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,75	9,00	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,52	0,05	0,52	1,04
76	165	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	6,00	8,00	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,02	0,19	0,39
77	166	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,75	5,00	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,01	0,05	0,10
78	167	Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	18,75	25,00	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	3,23	0,32	3,23	6,46

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
NIT. 806.000.327 – 7
Secretaria General

79	168	Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,25	7,00	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,02	0,23	0,46
80	169	olla de mono	Iecythis lanceolata	9,00	12,00	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,36	0,04	0,36	0,73
81	170	Campano	Samanea saman	10,50	14,00	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,90	0,09	0,90	1,80
82	171	Campano	Samanea saman	22,50	30,00	3,04	0,97	0,94	0,48	0,23	0,74	0,60	9,93	0,99	9,93	19,86
83	172	Payande	Pithecellobim sp	7,50	10,00	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,02	0,17	0,33
84	173	Payande	Pithecellobim sp	6,75	9,00	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,14	0,01	0,14	0,27
85	174	Coquillo	Lecythis minor	2,25	3,00	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,06	0,01	0,06	0,12
86	175	Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,25	7,00	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,40	0,04	0,40	0,80
87	176	Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,75	5,00	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,01	0,05	0,10
88	177	Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,75	5,00	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,00	0,03	0,07
89	178	Campano	Samanea saman	10,50	14,00	2,16	0,69	0,47	0,34	0,12	0,37	0,60	2,34	0,23	2,34	4,68
90	179	Teca	Tectona grandis	7,50	10,00	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,04	0,40	0,80
91	180	Guacamayo	Triplaris americana	10,50	14,00	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,66	0,07	0,66	1,33
92	181	Roble	Tabebuia rosea	3,00	4,00	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,04	0,00	0,04	0,08
93	182	Palma de Vino	Attalea butyracea	6,00	8,00	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,00	0,02	0,04
94	183	Roble	Tabebuia rosea	6,00	8,00	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,03	0,30	0,61
95	184	Mora	Maclura tinctoria	10,50	14,00	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,45	0,05	0,45	0,90
96	201	Campano	Samanea saman	12,75	17,00	2,72	0,87	0,75	0,43	0,19	0,59	0,60	4,50	0,45	4,50	9,01
97	212	Coquillo	Lecythis minor	6,75	9,00	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,23	0,02	0,23	0,45
98	229	Guarumo	Cecropia peltata	10,50	14,00	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,60	0,06	0,60	1,19
99	230	Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,50	6,00	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,00	0,03	0,07
100	231	Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,25	7,00	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,01	0,10	0,20
101	232	Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,75	9,00	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,01	0,12	0,25
102	233	Coquillo	Lecythis minor	3,75	5,00	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,00	0,04	0,09
103	234	Mora	Maclura tinctoria	4,88	6,50	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	0,54	0,05	0,54	1,09
104	235	Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,75	5,00	1,49	0,47	0,22	0,24	0,06	0,18	0,60	0,40	0,04	0,40	0,80
105	236	Mora	Maclura tinctoria	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
106	237	Mora	Maclura tinctoria	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
107	238	Mora	Maclura tinctoria	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108	239	Mora	Maclura tinctoria	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
109	240	Mora	Maclura tinctoria	6,00	8,00	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,00	0,05	0,09
110	241	Jobo	Pithecellobim dulce	11,25	15,00	1,41	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,07	0,11	1,07	2,14
111	242	Espino	Cratagus mongyna	9,75	13,00	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,21	0,02	0,21	0,42
112	243	Espino	Cratagus mongyna	2,25	3,00	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,07	0,01	0,07	0,14
113	244	Espino	Cratagus mongyna	6,00	8,00	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,02	0,24	0,48
114	245	Naranjuelo	Capparis odoratissima	4,50	6,00	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,00	0,05	0,09
115	246	Espino	Cratagus mongyna	6,00	8,00	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,01	0,07	0,14
116	247	Mora	Maclura tinctoria	6,75	9,00	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,06	0,63	1,26
117	248	Camajon	Sterculia apetala	16,50	22,00	2,76	0,88	0,77	0,44	0,19	0,61	0,60	6,00	0,60	6,00	12,00
118	249	Mora	Maclura tinctoria	15,00	20,00	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,40	0,14	1,40	2,81
119	250	Mora	Maclura tinctoria	3,75	5,00	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,00	0,04	0,08
120	251	Espino	Cratagus mongyna	9,00	12,00	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,79	0,08	0,79	1,59
121	252	Campano	Samanea saman	10,50	14,00	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,87	0,09	0,87	1,75
122	253	Espino	Cratagus mongyna	4,50	6,00	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,01	0,09	0,17

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

123	254	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,50	10,00	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,25	0,03	0,25	0,51
124	255	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,25	7,00	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,02	0,24	0,47
125	256	Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
126	257	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,75	9,00	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,02	0,25	0,50
127	258	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,00	8,00	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,02	0,17	0,33
128	259	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,25	7,00	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,01	0,10	0,21
129	260	Campano	<i>Samanea saman</i>	16,50	22,00	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	4,54	0,45	4,54	9,08
130	261	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	10,50	14,00	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,33	0,03	0,33	0,66
131	262	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,50	10,00	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,02	0,15	0,30
132	263	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,50	10,00	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,01	0,15	0,29
133	264	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,75	9,00	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,02	0,25	0,50
134	265	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,50	6,00	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,25	0,03	0,25	0,50
135	266	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	13,50	18,00	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,52	0,05	0,52	1,04
136	267	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	17,25	23,00	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,40	0,04	0,40	0,81
137	268	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	11,25	15,00	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,09	0,01	0,09	0,17
138	269	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,00	12,00	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,02	0,15	0,31
139	270	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	3,00	4,00	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,17	0,02	0,17	0,35
140	271	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,00	8,00	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,01	0,13	0,26
141	272	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	8,25	11,00	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,05	0,46	0,92
142	273	Campano	<i>Samanea saman</i>	9,00	12,00	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,26	0,03	0,26	0,52
143	274	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	3,75	5,00	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,01	0,06	0,12
144	275	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	3,00	4,00	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,26	0,03	0,26	0,53
145	276	Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	5,25	7,00	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,00	0,02	0,05
146	277	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,25	7,00	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,02	0,16	0,31
147	278	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,00	8,00	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,34	0,03	0,34	0,68
148	279	Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,00	8,00	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,04	0,41	0,83
149	280	Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	9,00	12,00	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,33	0,03	0,33	0,65
150	281	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	4,50	6,00	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,01	0,06	0,13
151	282	Campano	<i>Samanea saman</i>	10,50	14,00	1,23	0,39	0,15	0,20	0,04	0,12	0,60	0,76	0,08	0,76	1,52
152	283	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,75	13,00	1,19	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,66	0,07	0,66	1,32
153	284	Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,00	12,00	1,18	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,60	0,06	0,60	1,20
154	285	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	8,25	11,00	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,01	0,10	0,20
155	286	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,00	8,00	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,03	0,29	0,57
156	287	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,50	2,00	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
157	288	Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	18,75	25,00	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	1,20	0,12	1,20	2,41
158	289	Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	18,75	25,00	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	1,33	0,13	1,33	2,66
159	290	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	11,25	15,00	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,02	0,23	0,45
160	291	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	3,00	4,00	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,00	0,04	0,08
161	292	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	3,00	4,00	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,01	0,06	0,11
162	293	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,00	8,00	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,02	0,24	0,48
163	294	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	11,25	15,00	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,02	0,23	0,45
164	295	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,50	10,00	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,30	0,03	0,30	0,59
165	296	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	15,00	20,00	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,72	0,07	0,72	1,43
166	297	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,75	13,00	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,04	0,42	0,84
167	298	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,00	12,00	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,11	0,01	0,11	0,21
168	299	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	12,00	16,00	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,36	0,04	0,36	0,72
169	300	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	13,50	18,00	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,38	0,04	0,38	0,76

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB


NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

170	301	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,00	8,00	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,01	0,14	0,28
171	302	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	3,00	4,00	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,01	0,06	0,12
172	303	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,25	7,00	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,02	0,19	0,38
173	304	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,50	10,00	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,01	0,05	0,10
174	305	Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,50	10,00	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	1,29	0,13	1,29	2,59
175	306	Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	3,75	5,00	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,01	0,06	0,12
176	1575	Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	4,50	6,00	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,01	0,13	0,25
177	1576	Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	4,50	6,00	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,00	0,05	0,09
178	1577	Matarraton	<i>Glinicidia sepium</i>	5,25	7,00	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,02	0,19	0,39
179	1578	Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,25	7,00	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,01	0,13	0,26
180	1579	Matarraton	<i>Glinicidia sepium</i>	5,25	7,00	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,02	0,16	0,32
181	1580	Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,25	15,00	1,79	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	1,72	0,17	1,72	3,44
182	1581	Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,50	14,00	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,35	0,13	1,35	2,70
183	1582	Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	15,00	20,00	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	3,28	0,33	3,28	6,56
184	1583	Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	10,50	14,00	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,69	0,07	0,69	1,37
185	1584	Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	10,50	14,00	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,35	0,13	1,35	2,70
186	1585	Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	9,75	13,00	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,81	0,08	0,81	1,62
187	1586	Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	7,50	10,00	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,27	0,03	0,27	0,54
188	1587	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,25	7,00	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,02	0,16	0,31
189	1588	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,50	6,00	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,01	0,09	0,19
190	1589	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,50	10,00	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,65	0,07	0,65	1,31
191	1590	Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,75	5,00	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,01	0,09	0,17
192	1591	Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	11,25	15,00	1,47	0,47	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,16	0,12	1,16	2,32
193	1592	Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,75	13,00	1,63	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,24	0,12	1,24	2,47
194	1593	Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	13,50	18,00	1,89	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	2,30	0,23	2,30	4,60
195	1594	Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,75	13,00	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,19	0,12	1,19	2,38
196	1595	Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	8,25	11,00	1,97	0,63	0,39	0,31	0,10	0,31	0,60	1,53	0,15	1,53	3,06
											22,59					
			TOTAL												139,48	278,96


Dicho esto se procedió a realizar la ubicación general de los puntos geográficos establecidos en las mediciones realizadas en campo y las entregadas por parte del usuario con el fin de verificar la veracidad geográfica de dichos puntos, encontrando lo siguiente:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
NIT. 806.000.327 – 7
Secretaría General



Mapa 2: Ubicación geográfica de árboles a aprovechar (CSB)

Una vez identificados los individuos arbóreos a aprovechar geográficamente se identificó la zona de vida y las condicionantes establecida en el terreno en cuestión mediante la zonificación ambiental actual del área de jurisdicción de la CSB, obteniendo como resultado la zonificación del Mapa 3.



Mapa 3 Zonificación Ambiental de la Zona

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Dentro de la zonificación ambiental de la CSB, los árboles a aprovechar en el proyecto encontramos la categoría de Áreas:

-APAG-C: Áreas de Producción agrícola y ganadera

-APAG-F: Áreas de producción agrícola y ganadera. Suelos aptos para el establecimiento de sistemas de producción Forestal

-APAG-AG: Áreas de producción agrícola y ganadera. Suelos aptos para el establecimiento de sistemas de producción Agroforestal

-APAG-C: Áreas de producción agrícola y ganadera. Suelos aptos para el establecimiento de sistemas de producción agrícola

-APAG-ZU: Áreas de producción agrícola y ganadera. Zonas urbanas

-AAP-CN: Áreas destinadas a la conservación y protección de las coberturas naturales

Luego de identificar la zona mediante la zonificación ambiental vigente, se puede establecer que el aprovechamiento de árboles aislados es compatible en estas áreas.

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo anteriormente descrito se conceptúa técnicamente lo siguiente:

1. Una vez verificada la información presentada por el señor Diego Armando Álvarez Hernández identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representate legal del CONSORCIO CONSTRU VÍAS identificado con NIT 901715.685-2.

2. Se realizó la corroboración de la información en campo que la información plasmada en el inventario forestal presentado por el usuario, esta cumple con los requisitos exigidos por la norma y los datos dasométricos encontrados en el inventario coinciden con la verificados en campo por lo que técnicamente se puede viabilizar la autorización de aprovechamiento de árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural, debido a la realización de la obra pública "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DA LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" de 1.595 árboles, con un volumen de 1247.88 metros cúbicos. Por lo tanto se debe establecer un aprovechamiento forestal de árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural de los árboles, los cuales se encuentran en la siguiente tabla por especies, el total de estos individuos se debe remitir dicha información al inventario entregado por parte del usuario.

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA VIA DESDE EL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ALT COM	ALT TOT	CAP m	DAP m	DAP^2	RADIO	RADIO^2	AREA BASAL	FACT FORM	VOL MAD Mt3	VOL COM Mt3	VOL TOTAL Mt3
Higo amarillo	Albizia guachepele	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Mora	Maclura tinctoria	11,3	15,0	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,89	0,89	1,79
Roble	Tabebuia rosea	13,5	18,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,58	2,58	5,16
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,90	0,90	1,81
Roble	Tabebuia rosea	11,3	15,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,99	0,99	1,99
Ceiba Tolua	Pachira quinata	11,3	15,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,48	0,48	0,97
Solera	Cordia alliodora	15,0	20,0	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	1,51	1,51	3,01
Camajon	Sterculia apetala	13,5	18,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,65	1,65	3,30
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	9,0	12,0	2,66	0,85	0,72	0,42	0,18	0,56	0,60	3,04	3,04	6,08
Campano	Samanea saman	12,8	17,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,56	1,56	3,12
Totumo	Crescentia cujete	6,8	9,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,54	0,54	1,09
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	9,0	12,0	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	1,97	1,97	3,94
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Ceiba Tolua	Pachira quinata	11,3	15,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,50	1,50	3,00
Ceiba Tolua	Pachira quinata	9,8	13,0	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	5,70	5,70	11,41
Roble	Tabebuia rosea	11,3	15,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,50	1,50	3,00
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,69	0,69	1,39
Ceiba Tolua	Pachira quinata	12,0	16,0	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	5,16	5,16	10,31
Campano	Samanea saman	9,0	12,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Roble	Tabebuia rosea	5,3	7,0	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,64	0,64	1,29
Teca	Tectona grandis	10,5	14,0	2,20	0,70	0,49	0,35	0,12	0,39	0,60	2,43	2,43	4,85
Teca	Tectona grandis	11,3	15,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,91	0,91	1,82
Teca	Tectona grandis	7,5	10,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,92	0,92	1,83
Guacamayo	Triplaris americana	15,0	20,0	1,79	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	2,29	2,29	4,59
Ceiba Tolua	Pachira quinata	13,5	18,0	3,10	0,99	0,97	0,49	0,24	0,76	0,60	6,19	6,19	12,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,44
Teca	Tectona grandis	10,5	14,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,9	6,5	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	9,0	12,0	1,87	0,60	0,35	0,30	0,09	0,28	0,60	1,50	1,50	3,01
Roble	Tabebuia rosea	13,5	18,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	1,25	1,25	2,49
Ceiba Tolua	Pachira quinata	9,0	12,0	1,83	0,58	0,34	0,29	0,08	0,27	0,60	1,44	1,44	2,88
Roble	Tabebuia rosea	15,0	20,0	1,86	0,59	0,35	0,30	0,09	0,28	0,60	2,48	2,48	4,96
Campano	Samanea saman	18,8	25,0	1,55	0,49	0,24	0,25	0,06	0,19	0,60	2,15	2,15	4,30
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,12	0,12	0,23
Ceiba Tolua	Pachira quinata	12,0	16,0	3,42	1,09	1,19	0,54	0,30	0,93	0,60	6,70	6,70	13,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,33	0,33	0,66
Ceiba Tolua	Pachira quinata	3,8	5,0	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,0	6,6	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,23	0,23	0,46

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	2,19	0,70	0,49	0,35	0,12	0,38	0,60	2,40	2,40	4,81
Campano	<i>Samanea saman</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	2,88	0,92	0,84	0,46	0,21	0,66	0,60	4,16	4,16	8,32
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	4,83	4,83	9,67
Teca	<i>Tectona grandis</i>	10,5	14,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,40	0,40	0,79
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	11,3	15,0	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	6,58	6,58	13,16
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	9,8	13,0	2,58	0,82	0,67	0,41	0,17	0,53	0,60	3,10	3,10	6,20
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	9,8	13,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,85	0,85	1,70
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	11,3	15,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,12	0,12	0,25
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	0,88	0,88	1,76
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,07	0,07	0,14
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	11,3	15,0	3,20	1,02	1,04	0,51	0,26	0,81	0,60	5,50	5,50	11,00
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	1,65	1,65	3,30
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Teca	<i>Tectona grandis</i>	18,8	25,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,84	0,84	1,68
Teca	<i>Tectona grandis</i>	14,3	19,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,72	2,72	5,44
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,65	0,53	0,28	0,26	0,07	0,22	0,60	1,17	1,17	2,34
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	10,5	14,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Teca	<i>Tectona grandis</i>	6,0	8,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,39
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	0,83	0,83	1,66
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	18,8	25,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	1,63	1,63	3,26
Campano	<i>Samanea saman</i>	20,3	27,0	1,56	0,50	0,25	0,25	0,06	0,19	0,60	2,35	2,35	4,71
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,72	0,72	1,43
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	3,8	5,0	0,22	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	7,5	10,0	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,64	0,64	1,29
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	7,5	10,0	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	3,22	3,22	6,45
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	11,3	15,0	2,03	0,65	0,42	0,32	0,10	0,33	0,60	2,21	2,21	4,43
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	20,3	27,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,87	0,87	1,75
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	13,5	18,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,19	0,19	0,39
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	6,0	8,0	1,73	0,55	0,30	0,28	0,08	0,24	0,60	0,86	0,86	1,71
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,65	0,53	0,28	0,26	0,07	0,22	0,60	0,97	0,97	1,95
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,46	0,46	0,91
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	13,4	17,8	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,79	0,79	1,57
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	10,5	14,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,72	0,72	1,44
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	13,5	18,0	2,50	0,80	0,63	0,40	0,16	0,50	0,60	4,03	4,03	8,06

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Campano	Samanea saman	12,8	17,0	2,95	0,94	0,88	0,47	0,22	0,69	0,60	5,30	5,30	10,60
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacamayo	Triplaris americana	11,3	15,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,09	0,09	0,17
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	18,8	25,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	1,08	1,08	2,17
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	18,8	25,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	1,29	1,29	2,58
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Uvero	Coccoloba uvifera	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,44
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	2,10	0,67	0,45	0,33	0,11	0,35	0,60	1,26	1,26	2,53
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,43	0,43	0,87
Teca	Tectona grandis	13,5	18,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,52	0,52	1,04
Teca	Tectona grandis	3,8	5,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,20
Ceiba Tolua	Pachira quinata	9,0	12,0	1,62	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,13	1,13	2,26
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,96	0,62	0,39	0,31	0,10	0,31	0,60	1,65	1,65	3,30
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,69	0,69	1,39
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,41	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,00	1,00	1,99
Mora	Maclura tinctoria	12,0	16,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,47	1,47	2,93
Teca	Tectona grandis	7,5	10,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,32	0,32	0,63
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	15,0	20,0	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	8,77	8,77	17,55
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,05	1,05	2,09
Guacamayo	Triplaris americana	3,0	4,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,81	1,61
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,29	0,58
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	Pithecellobim dulce	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	Pithecellobim dulce	8,3	11,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,8	9,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,53	0,53	1,06
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,35	0,35	0,70
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,56
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,13
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Campano	Samanea saman	7,5	10,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,00	1,00	2,00
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	1,89	1,89	3,79
Mora	Maclura tinctoria	15,0	20,0	1,47	0,47	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,55	1,55	3,10
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,52	0,52	1,03
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Guacamayo	Triplaris americana	12,8	17,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,60	0,60	1,19
Deiba Tolua	Pachira quinata	12,8	17,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,56	1,56	3,12
Mora	Maclura tinctoria	12,0	16,0	1,84	0,59	0,34	0,29	0,09	0,27	0,60	1,94	1,94	3,88
Mora	Maclura tinctoria	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Teca	Tectona grandis	9,8	13,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,63	0,63	1,25
Suan	Ficus dendrocida	7,5	10,0	3,40	1,08	1,17	0,54	0,29	0,92	0,60	4,14	4,14	8,28
Payande	Pithecellobim sp	7,5	10,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	Cratagus mongyna	9,0	12,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,46	0,93
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,70	0,70	1,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Mora	Maclura tinctoria	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	Cratagus mongyna	4,5	6,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Roble	Tabebuia rosea	7,5	10,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,40	0,80
Payande	Pithecellobim sp	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
olla de mono	Iecythis lanceolata	4,5	6,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,55	0,55	1,10
Roble	Tabebuia rosea	7,5	10,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,81	1,61
Teca	Tectona grandis	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
olla de mono	Iecythis lanceolata	3,8	5,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	Guazuma ulmifolia	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,45
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	1,85	0,59	0,35	0,29	0,09	0,27	0,60	0,98	0,98	1,96
olla de mono	Iecythis lanceolata	7,5	10,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Payande	Pithecellobim sp	4,5	6,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,15
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,22	0,22	0,43
Payande	Pithecellobim sp	7,5	10,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,53	0,53	1,07
Campano	Samanea saman	11,3	15,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,41	0,41	0,81
Mora	Maclura tinctoria	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	2,50	2,50	4,99
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,35	0,35	0,70
Mora	Maclura tinctoria	6,8	9,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,52	0,52	1,04
Payande	Pithecellobim sp	6,0	8,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,39
Mora	Maclura tinctoria	3,8	5,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	3,23	3,23	6,46
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,46
olla de mono	Iecythis lanceolata	9,0	12,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,36	0,36	0,73
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,90	0,90	1,80
Campano	Samanea saman	22,5	30,0	3,04	0,97	0,94	0,48	0,23	0,74	0,60	9,93	9,93	19,86
Payande	Pithecellobim sp	7,5	10,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	6,8	9,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,14	0,14	0,27
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	2,3	3,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,40	0,40	0,80
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	2,16	0,69	0,47	0,34	0,12	0,37	0,60	2,34	2,34	4,68
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7,5	10,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,40	0,80
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	10,5	14,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,66	0,66	1,33
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	3,0	4,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6,0	8,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,61
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	10,5	14,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,45	0,45	0,90
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	11,3	15,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,61	0,61	1,23
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	2,80	0,89	0,79	0,45	0,20	0,62	0,60	1,97	1,97	3,93
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2,3	3,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,07	0,07	0,13
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	2,26	0,72	0,52	0,36	0,13	0,41	0,60	2,74	2,74	5,49
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	6,0	8,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,77	0,77	1,54
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,55
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	10,5	14,0	2,04	0,65	0,42	0,32	0,11	0,33	0,60	2,09	2,09	4,17
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	13,5	18,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,45	1,45	2,90
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	3,0	4,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,8	9,0	3,86	1,23	1,51	0,61	0,38	1,19	0,60	4,80	4,80	9,60
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,8	9,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,41	0,41	0,82
Campano	<i>Samanea saman</i>	12,8	17,0	2,72	0,87	0,75	0,43	0,19	0,59	0,60	4,50	4,50	9,01
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,79	0,79	1,59
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,62	1,62	3,25
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,47	0,47	0,95
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	9,0	12,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,37	0,37	0,74
Campano	<i>Samanea saman</i>	15,0	20,0	1,87	0,60	0,35	0,30	0,09	0,28	0,60	2,50	2,50	5,01
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	2,80	0,89	0,79	0,45	0,20	0,62	0,60	4,21	4,21	8,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	2,65	2,65	5,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,16	0,16	0,32
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	6,8	9,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,45
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,12	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,01
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	3,0	4,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	1,52	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,58	0,58	1,16
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Campano	<i>Samanea saman</i>	4,5	6,0	1,46	0,46	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	0,46	0,46	0,92
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,9	6,5	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,63	0,63	1,25
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	7,5	10,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,8	5,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,0	4,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	11,3	15,0	2,18	0,69	0,48	0,35	0,12	0,38	0,60	2,55	2,55	5,11
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11,3	15,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,70	0,70	1,40
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10,5	14,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,60	0,60	1,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	3,8	5,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,9	6,5	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	0,54	0,54	1,09
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	1,49	0,47	0,22	0,24	0,06	0,18	0,60	0,40	0,40	0,80
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Jobo	<i>Pithecellobium dulce</i>	11,3	15,0	1,41	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,07	1,07	2,14
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,8	13,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,21	0,21	0,42
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	2,3	3,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,07	0,07	0,14
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,48
Naranjuelo	<i>Capparis odoratissima</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,8	9,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,63	1,26
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	16,5	22,0	2,76	0,88	0,77	0,44	0,19	0,61	0,60	6,00	6,00	12,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	15,0	20,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,40	1,40	2,81
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,0	12,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,79	0,79	1,59
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,87	0,87	1,75
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,51
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,50
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,3	7,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Campano	Samanea saman	16,5	22,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	4,54	4,54	9,08
Espino	Cratagus mongyna	10,5	14,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,33	0,33	0,66
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,29
Espino	Cratagus mongyna	6,8	9,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,50
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,25	0,25	0,50
Espino	Cratagus mongyna	13,5	18,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,52	0,52	1,04
Espino	Cratagus mongyna	17,3	23,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,40	0,40	0,81
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,09	0,09	0,17
Espino	Cratagus mongyna	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,17	0,17	0,35
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Espino	Cratagus mongyna	8,3	11,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,46	0,92
Campano	Samanea saman	9,0	12,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,26	0,26	0,52
Espino	Cratagus mongyna	3,8	5,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,26	0,26	0,53
Uvero	Coccoloba uvifera	5,3	7,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,34	0,34	0,68
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	6,0	8,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,41	0,83
Cañandonga	Cassia grandis	9,0	12,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,33	0,33	0,65
Payande	Pithecellobim sp	4,5	6,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,23	0,39	0,15	0,20	0,04	0,12	0,60	0,76	0,76	1,52
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	1,19	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,66	0,66	1,32
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,18	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,60	0,60	1,20
Payande	Pithecellobim sp	8,3	11,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,57
Guacimo	Guazuma ulmifolia	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	1,20	1,20	2,41
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	1,33	1,33	2,66
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,23	0,45
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,11
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,48
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,23	0,45
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,59
Espino	Cratagus mongyna	15,0	20,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,72	0,72	1,43
Espino	Cratagus mongyna	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
Espino	Cratagus mongyna	9,0	12,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,21
Espino	Cratagus mongyna	12,0	16,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,36	0,36	0,72
Espino	Cratagus mongyna	13,5	18,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,38	0,38	0,76
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Espino	Cratagus mongyna	5,3	7,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,38
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	1,29	1,29	2,59
Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	3,8	5,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	4,5	6,0	1,31	0,42	0,17	0,21	0,04	0,14	0,60	0,37	0,37	0,74
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	8,3	11,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	1,14	1,14	2,28
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,32	0,32	0,64
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,81	0,81	1,62
Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	3,0	4,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,8	9,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	1,72	1,72	3,44
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	10,5	14,0	2,10	0,67	0,45	0,33	0,11	0,35	0,60	2,21	2,21	4,42
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,52	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,66	0,66	1,32
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,77	0,77	1,54
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,20	0,20	0,39
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Campano	<i>Samanea saman</i>	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	2,3	3,0	1,57	0,50	0,25	0,25	0,06	0,20	0,60	0,26	0,26	0,53
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	0,69	0,69	1,38
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	1,5	2,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	0,41	0,41	0,83
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	9,0	12,0	1,25	0,40	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	0,67	0,67	1,34
Campano	<i>Samanea saman</i>	7,5	10,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,16	1,16	2,32
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,21	0,21	0,42
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,31	0,31	0,62
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	9,0	12,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	1,72	1,72	3,44
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,21	1,21	2,42
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	12,0	16,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,60	0,60	1,19
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	13,5	18,0	1,25	0,40	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	1,01	1,01	2,01
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,62	0,62	1,25
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	2,80	0,89	0,79	0,45	0,20	0,62	0,60	4,21	4,21	8,42
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	9,0	12,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,70	0,70	1,41
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,38	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,82	0,82	1,64
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,62	1,62	3,25
Campano	<i>Samanea saman</i>	17,3	23,0	2,94	0,94	0,88	0,47	0,22	0,69	0,60	7,12	7,12	14,24
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,43	0,43	0,85
Naranjuelo	<i>Capparis odoratissima</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Campano	<i>Samanea saman</i>	13,5	18,0	2,16	0,69	0,47	0,34	0,12	0,37	0,60	3,01	3,01	6,01
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,60	0,60	1,20
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,64	0,64	1,29

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	8,3	11,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,53	0,53	1,07
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,10	1,10	2,20
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	16,9	22,5	4,04	1,29	1,65	0,64	0,41	1,30	0,60	13,15	13,15	26,30
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,25	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,1	5,5	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	0,52	0,52	1,03
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,42	0,45	0,20	0,23	0,05	0,16	0,60	0,87	0,87	1,73
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	4,5	6,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,48	0,48	0,97
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	0,52	0,52	1,03
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,8	9,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,8	9,0	2,50	0,80	0,63	0,40	0,16	0,50	0,60	2,01	2,01	4,03
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8,3	11,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,48	0,48	0,95
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	2,3	3,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,43
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,30
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	4,5	6,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	0,62	0,62	1,24
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,46	0,46	0,92
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	0,58	0,58	1,16
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	9,8	13,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,69	0,69	1,39
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,01	2,01	4,01
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,20	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,01
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,30
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,78	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	0,91	0,91	1,82
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,92	0,61	0,37	0,31	0,09	0,29	0,60	1,06	1,06	2,11
Payande	<i>Pithecellobium sp</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Campano	<i>Samanea saman</i>	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Campano	<i>Samanea saman</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Campano	Samanea saman	5,3	7,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Payande	Pithecellobim sp	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,36
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Uvero	Coccoloba uvifera	2,3	3,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
cañandonga	Cassia grandis	4,5	6,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Cañandonga	Cassia grandis	5,3	7,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,21	0,21	0,42
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Cañandonga	Cassia grandis	5,3	7,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Cañandonga	Cassia grandis	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Roble	Tabebuia rosea	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Uvero	Coccoloba uvifera	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,73
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Jobo	Pithecellobim dulce	8,3	11,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,49	0,49	0,97
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Jobo	Pithecellobim dulce	12,0	16,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,54	1,54	3,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,39	0,39	0,79
Guacimo	Guazuma ulmifolia	8,3	11,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,17	0,17	0,34
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,27
Mora	Maclura tinctoria	3,0	4,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Mora	Maclura tinctoria	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Uvero	Coccoloba uvifera	2,3	3,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Campano	Samanea saman	6,0	8,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,23
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Campano	Samanea saman	7,5	10,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,34	0,34	0,69
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Cañandonga	Cassia grandis	9,0	12,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,38	0,38	0,76
Uvero	Coccoloba uvifera	6,8	9,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Roble	Tabebuia rosea	7,5	10,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,59	0,59	1,17
Pimiento	Schinus molle	2,3	3,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañandonga	Cassia grandis	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Totumo	Crescentia cujete	3,8	5,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Uvero	Coccoloba uvifera	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Uvero	Coccoloba uvifera	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañandonga	Cassia grandis	2,3	3,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,11	0,11	0,21
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,27
Pepo	Sapindus saponaria	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Roble	Tabebuia rosea	9,0	12,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,32	0,32	0,64
Guarumo	Cecropia peltata	3,0	4,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Campano	Samanea saman	11,3	15,0	3,40	1,08	1,17	0,54	0,29	0,92	0,60	6,21	6,21	12,42
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Cañandonga	Cassia grandis	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Guamo	Inga edulis	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	6,8	9,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,34	0,34	0,67
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,26	0,26	0,52
Guamo	Inga edulis	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03		0,00	0,00	0,00
Uvero	Coccoloba uvifera	6,0	8,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Guamo	Inga edulis	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Pepo	Sapindus saponaria	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañandonga	Cassia grandis	10,5	14,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,13	1,13	2,26
Payande	Pithecellobim sp	2,3	3,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,07	0,07	0,14
Guamo	Inga edulis	7,5	10,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,49
Guamo	Inga edulis	9,0	12,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,13	0,13	0,27
Guamo	Inga edulis	7,5	10,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Cañandonga	Cassia grandis	15,0	20,0	1,75	0,56	0,31	0,28	0,08	0,24	0,60	2,19	2,19	4,39
Guamo	Inga edulis	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	Guazuma ulmifolia	8,3	11,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,22	0,22	0,44
Fruta pava	Spondias mombin	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Guamo	Inga edulis	11,3	15,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,34	0,34	0,67
Vara Blanca	Casearia corybosa	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Campano	Samanea saman	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Guamo	<i>Inga edulis</i>	5,3	7,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Guamo	<i>Inga edulis</i>	5,3	7,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Guamo	<i>Inga edulis</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Guamo	<i>Inga edulis</i>	6,8	9,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,38
Guamo	<i>Inga edulis</i>	4,5	6,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,50	0,50	1,00
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,29
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,24	0,24	0,48
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	10,5	14,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,69	0,69	1,37
Guamo	<i>Inga edulis</i>	7,5	10,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,53
Guamo	<i>Inga edulis</i>	6,8	9,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,28	0,28	0,56
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	15,0	20,0	1,31	0,42	0,17	0,21	0,04	0,14	0,60	1,23	1,23	2,46
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,39	1,39	2,78
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,74	0,74	1,48
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,39	0,39	0,77
Campano	<i>Samanea saman</i>	12,0	16,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,28	0,28	0,56
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
olla de mono	<i>lecythis lanceolata</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	20,3	27,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,38	0,38	0,77
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,44	0,44	0,87
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,32	0,32	0,64
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	12,0	16,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,23	0,45
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	12,0	16,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,72	0,72	1,44
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	15,0	20,0	1,38	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	1,36	1,36	2,73
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,46
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,0	4,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	1,44	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,97	0,97	1,93
Campano	<i>Samanea saman</i>	6,8	9,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,48
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,72	0,72	1,44
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	12,0	16,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,37	0,37	0,73
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,8	5,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,19	0,19	0,39
Campano	<i>Samanea saman</i>	15,0	20,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,40	1,40	2,81

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,16	0,16	0,32
Lechoso	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,44
Lechoso	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Mango	<i>Mangifera indica</i>	6,0	8,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,55
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	4,5	6,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	5,3	7,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,56	0,56	1,13
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	2,3	3,0	0,37	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,0	4,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,15
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	6,0	8,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,38
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	2,3	3,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,31
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,27
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,31	0,31	0,62
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,29
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,47
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,52	0,52	1,04
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,65	0,65	1,30
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,22	0,22	0,43
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,27	0,27	0,53
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,45
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	4,5	6,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,36	0,36	0,72
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,20
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	9,8	13,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	1,86	1,86	3,72
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,27	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,65	0,65	1,30
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Algarrobo	<i>Ceratonía silíqua</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11,3	15,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,34	0,34	0,69
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10,5	14,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,18	0,18	0,36
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	10,5	14,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,41	0,41	0,81
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	8,3	11,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,16	0,16	0,32
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	0,88	0,88	1,76
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,29	0,58
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	2,3	3,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,40	0,80
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,8	5,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Algarrobo	<i>Ceratonia siliqua</i>	3,8	5,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	7,5	10,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,53
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	7,5	10,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,34	0,34	0,67
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6,8	9,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,46	0,93
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,55
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,19	0,19	0,38
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,51
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6,8	9,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,29	0,58

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Sangregado	<i>Croton sp</i>	9,0	12,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,53	0,53	1,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Sangregado	<i>Croton sp</i>	9,0	12,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,36	0,36	0,71
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,22	0,22	0,44
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,8	9,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Lechoso	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,0	8,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,54	0,54	1,08
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,0	8,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,43
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,8	9,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	7,5	10,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,73
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,66	0,66	1,33
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,24	0,24	0,48
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,24	0,24	0,48
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	12,0	16,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,64	0,64	1,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,36	0,36	0,71
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,34	0,34	0,67
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	7,5	10,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,55
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	5,3	7,0	0,29	0,09	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,39
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,8	13,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,20	0,20	0,39
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	11,3	15,0	1,54	0,49	0,24	0,25	0,06	0,19	0,60	1,27	1,27	2,55
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,33	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,76	0,76	1,52
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	8,3	11,0	1,21	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,58	0,58	1,15

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,27
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,58
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	1,21	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,52	0,52	1,05
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,0	4,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,29
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,0	4,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,53
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,53
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	3,8	5,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,24	0,24	0,48
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,38	1,38	2,75
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,41	0,41	0,82
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,19
Suan	<i>Ficus dendrocida</i>	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,33
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	9,0	12,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,41
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,03	0,03	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,41
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,46	0,46	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	0,76	0,76	1,53
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,27	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,0	8,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,19	0,19	0,37
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	11,3	15,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,99	0,99	1,99
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	10,5	14,0	1,19	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,71	0,71	1,42
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	9,0	12,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,43	0,43	0,86
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	10,5	14,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,56	0,56	1,13
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	10,5	14,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,40	0,40	0,79
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,14	0,14	0,29
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,51
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	7,5	10,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,49
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,8	5,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,84	0,84	1,68
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,0	4,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,14	0,14	0,29
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,51
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,6	7,5	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,56	0,56	1,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	2,3	3,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,05
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,27
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Abeto	<i>Abies alba</i>	5,3	7,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,38
Abeto	<i>Abies alba</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,0	8,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,44
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,0	8,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,34	0,34	0,67
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	9,0	12,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	9,0	12,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,8	9,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,31	0,31	0,62
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,59	0,59	1,18
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,84	0,84	1,68
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,62	0,62	1,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,8	13,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,87	0,87	1,75
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	12,0	16,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,83	0,83	1,65
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	1,03	1,03	2,07
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,8	13,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,57	0,57	1,15
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	13,5	18,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	1,06	1,06	2,11
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11,3	15,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,77	0,77	1,55
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	10,5	14,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,63	0,63	1,26
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	8,3	11,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	13,5	18,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,93	0,93	1,86
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,43	0,43	0,87
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	8,3	11,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,52	0,52	1,04
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,8	13,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,91	0,91	1,82
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	7,5	10,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,16	1,16	2,32
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	9,0	12,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,55	0,55	1,10
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,25	0,40	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	0,56	0,56	1,12
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,35	0,35	0,69
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,36	0,36	0,73
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	3,09	3,09	6,19
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	4,5	6,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,19	0,19	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,36	0,36	0,72
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,53	0,53	1,06
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,39	0,39	0,78

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,44	0,44	0,88
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	6,8	9,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,54	0,54	1,09
Vara Blanca	<i>Casearia corybosa</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,20	0,20	0,40
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,42	0,42	0,85
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,44	0,44	0,88
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,70	0,70	1,40
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,54	0,54	1,09
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	7,5	10,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,81	1,61
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,48	0,48	0,97
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,36
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,8	9,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,63	1,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,0	8,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,41	0,83
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,0	8,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,25	0,25	0,50
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,56	0,56	1,12
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,63	1,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,62	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,94	0,94	1,88
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,0	4,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,05	0,05	0,10
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	3,0	4,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,19	0,19	0,39
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	3,0	4,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,8	9,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	2,3	3,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	2,3	3,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,04
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Sangregado	Croton sp	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
ceiba tolua	Pachira quinata	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
ceiba tolua	Pachira quinata	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	Pithecellobim dulce	2,3	3,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Guarumo	Cecropia peltata	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	Pithecellobim dulce	3,8	5,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	Brosimum utile	6,8	9,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Papayote	Cochlospermum vitifolium	3,8	5,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Cañandonga	Cassia grandis	3,0	4,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,07	0,07	0,15
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañandonga	Cassia grandis	7,5	10,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,06	0,06	0,12
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,04
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Jobo	Pithecellobim dulce	3,8	5,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,22	0,22	0,45
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,52
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	4,5	6,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,19	0,19	0,37
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,42	0,42	0,84
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,8	5,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,10	0,10	0,21
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,27
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,64	0,64	1,28
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Algarrobo	<i>Ceratonía silíqua</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Algarrobo	<i>Ceratonía silíqua</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,39	1,39	2,78
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,51	0,51	1,02
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	0,8	1,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,02	0,02	0,05
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,98	0,98	1,97
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Almendo	<i>Terminalia catappa</i>	6,0	8,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,41
Sangregado	<i>Croton sp</i>	9,0	12,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,73	0,73	1,45
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Spondias mombin</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,46	0,46	0,91
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	9,0	12,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,48	0,48	0,97
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	0,5	0,7	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,1	1,5	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,01	0,01	0,02

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	1,24	0,39	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	0,55	0,55	1,10
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,22	0,22	0,44
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,29	0,09	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,25	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,0	4,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Ceiba tolua	<i>Pachira quinata</i>	4,5	6,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,23	0,23	0,46
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,53
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,27
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	7,5	10,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,16	0,16	0,31
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,24	0,24	0,47
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,49
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,25	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	2,3	3,0	0,33	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,25	0,25	0,51
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,46
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,59
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Bocachino	<i>Coccoloba acuminata</i>	4,5	6,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Bocachino	<i>Coccoloba acuminata</i>	5,3	7,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	9,0	12,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,18	0,18	0,35
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Pepo	<i>Sapindus saponaria</i>	6,8	9,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,58
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,25	0,25	0,50
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,35	0,35	0,70
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,40	0,40	0,79
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	6,8	9,0	1,18	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,45	0,45	0,90
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,24	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	6,0	8,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,37	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,18	0,18	0,36
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,61	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Bocachino	<i>Coccoloba acuminata</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	15,0	20,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,58	0,58	1,16
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	16,5	22,0	2,08	0,66	0,44	0,33	0,11	0,34	0,60	3,41	3,41	6,82
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,52
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,44
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,0	4,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,25	0,25	0,51
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,01
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,25	0,25	0,50
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,46
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	6,0	8,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,29
Totumo	<i>Crescentia cujete</i>	3,8	5,0	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,15
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,49
Uvita	<i>Cordia alba</i>	6,0	8,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	8,3	11,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,43	0,43	0,87
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,0	8,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,42
Trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	7,5	10,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33
Trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Vara Blanca	<i>Casearia corybosa</i>	4,5	6,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,0	4,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Algarrobo	<i>Ceratonia siliqua</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Algarrobo	<i>Ceratonia siliqua</i>	6,8	9,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,0	4,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	5,3	7,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,21	0,21	0,42
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,0	4,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	5,3	7,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,8	5,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,54	0,49	0,24	0,25	0,06	0,19	0,60	0,68	0,68	1,36
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	2,3	3,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,05
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Sangregado	<i>Croton sp</i>	4,5	6,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,20	0,20	0,40
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	0,90	0,90	1,81
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,50
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	4,5	6,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,12	0,12	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,12	0,12	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	5,3	7,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Sangregado	<i>Croton sp</i>	10,5	14,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,32	0,32	0,64
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Sangregado	<i>Croton sp</i>	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Sangregado	<i>Croton sp</i>	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,26	0,26	0,51
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	7,5	10,0	1,88	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	1,27	1,27	2,53
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	5,3	7,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,41
Chinito	<i>Nephelium lappaceum</i>	4,5	6,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,19
Chinito	<i>Nephelium lappaceum</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Chinito	<i>Nephelium lappaceum</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,46
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	11,3	15,0	1,38	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	1,02	1,02	2,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,41
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,41	0,41	0,82
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,77	0,77	1,55
Sangregado	<i>Croton sp</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Sangregado	<i>Croton sp</i>	10,5	14,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,62	1,62	3,25
Sangregado	<i>Croton sp</i>	13,5	18,0	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	1,02	1,02	2,05
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,46
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	10,5	14,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,61	0,61	1,21
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,48
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,38	0,38	0,76
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,31
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	6,8	9,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,61
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,61
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,42	0,42	0,84
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	5,3	7,0	1,59	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,63	0,63	1,27

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	1,94	0,62	0,38	0,31	0,10	0,30	0,60	0,81	0,81	1,62
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	2,06	0,66	0,43	0,33	0,11	0,34	0,60	0,91	0,91	1,82
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	2,02	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	0,88	0,88	1,75
Guamo	<i>Inga edulis</i>	5,3	7,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	5,3	7,0	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	1,33	1,33	2,65
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,55
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	5,3	7,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,46	0,46	0,92
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,36
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	4,5	6,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	3,8	5,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,08	0,08	0,17
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,46	0,46	0,93
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	0,62	0,62	1,25
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	5,3	7,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,36
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,41
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,41
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	1,83	0,58	0,34	0,29	0,08	0,27	0,60	1,68	1,68	3,36
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,39	0,39	0,77
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,3	7,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,32	0,32	0,64
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,46
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,26	0,26	0,52
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	1,88	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	0,76	0,76	1,52
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,25	0,25	0,50
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,37	0,37	0,74
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,52	0,52	1,04
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,32	0,32	0,64
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,22	0,22	0,45
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,46	0,46	0,92
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,25	0,25	0,49
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,48	0,48	0,97
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,41	0,83
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,39	0,39	0,78
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	10,5	14,0	1,84	0,59	0,34	0,29	0,09	0,27	0,60	1,70	1,70	3,39
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,25	0,25	0,50
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,81	0,58	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	0,94	0,94	1,88
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,34
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,35	0,35	0,69
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,44	0,44	0,88
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	2,05	0,65	0,43	0,33	0,11	0,33	0,60	2,26	2,26	4,51
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	9,0	12,0	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	1,01	1,01	2,01
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,60	0,60	1,19
Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Sangregado	<i>Croton sp</i>	12,0	16,0	1,52	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,32	1,32	2,65
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	9,0	12,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,57	0,57	1,14
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,49
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	6,8	9,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,61
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	14,3	19,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	1,15	1,15	2,30
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	10,5	14,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,81	0,81	1,62
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,27
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,09	0,18
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Campano	<i>Samanea saman</i>	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,31
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,41	0,41	0,82
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,24	0,24	0,48
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,75
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,39
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,46	0,46	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,14	1,14	2,29
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,77	0,56	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	1,57	1,57	3,14
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,27	0,27	0,54
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,56
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	4,5	6,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,0	8,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,54	0,54	1,08
Campano	<i>Samanea saman</i>	13,5	18,0	2,10	0,67	0,45	0,33	0,11	0,35	0,60	2,84	2,84	5,69
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	12,0	16,0	1,51	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,31	1,31	2,61
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	12,8	17,0	1,83	0,58	0,34	0,29	0,08	0,27	0,60	2,04	2,04	4,08
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,41	0,41	0,82
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,8	9,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,36	0,36	0,72
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,0	12,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,47	0,47	0,95
Campano	<i>Samanea saman</i>	12,8	17,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,47	0,47	0,94
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	11,3	15,0	1,94	0,62	0,38	0,31	0,10	0,30	0,60	2,02	2,02	4,04
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,81	0,81	1,61
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,58	0,58	1,16
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,43	0,43	0,85
Pomelo	<i>Citrus maxima</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,40
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,31
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	12,0	16,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	1,17	1,17	2,34
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	13,5	18,0	2,04	0,65	0,42	0,32	0,11	0,33	0,60	2,68	2,68	5,36
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	11,3	15,0	1,42	0,45	0,20	0,23	0,05	0,16	0,60	1,08	1,08	2,17
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,48
lobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Papayote	Cochlospermum vitifolium	9,0	12,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,40
Caimito	Pouteria caimito	7,5	10,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,75
Muñeco	Cordia eriostigma	7,5	10,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,38	0,38	0,76
Guarumo	Cecropia peltata	13,5	18,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	1,32	1,32	2,64
Jobo	Pithecellobim dulce	9,0	12,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,16	1,16	2,31
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,34	0,34	0,69
Santa Cruz	Brosimum utile	10,5	14,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,38	0,38	0,76
Santa Cruz	Brosimum utile	8,3	11,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,59	0,59	1,17
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	Pithecellobim dulce	9,0	12,0	1,42	0,45	0,20	0,23	0,05	0,16	0,60	0,87	0,87	1,73
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,24	0,24	0,48
Santa Cruz	Brosimum utile	12,8	17,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,48	0,48	0,96
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,45
Guacamayo	Triplaris americana	7,5	10,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,45	0,45	0,90
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Totumo	Crescentia cujete	2,3	3,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43
Santa Cruz	Brosimum utile	6,8	9,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,33	0,33	0,66
Jobo	Pithecellobim dulce	9,8	13,0	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	1,09	1,09	2,18
Trebol	Platymiscium pinnatum	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Santa Cruz	Brosimum utile	10,5	14,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,60	0,60	1,19
Sangregado	Croton sp	6,8	9,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,27	0,27	0,55
Totumillo de Monte	Amphitecna sp	6,0	8,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,31	0,31	0,62
Trebol	Platymiscium pinnatum	8,3	11,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,67	0,67	1,33
Buche de gallina	Hasseltia floribunda	6,0	8,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,46
Buche de gallina	Hasseltia floribunda	5,3	7,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Trebol	Platymiscium pinnatum	7,5	10,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,46
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	6,0	8,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,36
Buche de gallina	Hasseltia floribunda	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Jobo	Pithecellobim dulce	10,5	14,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,40	1,40	2,80
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,20

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Guarumo	Cecropia peltata	7,5	10,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,75
Totumillo de Monte	Amphitecna sp	4,5	6,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,34	0,34	0,68
Sangregado	Croton sp	11,3	15,0	2,60	0,83	0,68	0,41	0,17	0,54	0,60	3,63	3,63	7,26
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,39	0,39	0,78
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,44	0,44	0,88
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,48	0,48	0,96
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,31
Guacamayo	Triplaris americana	11,3	15,0	1,72	0,55	0,30	0,27	0,07	0,24	0,60	1,59	1,59	3,18
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	14,3	19,0	2,12	0,67	0,46	0,34	0,11	0,36	0,60	3,06	3,06	6,12
Naranjuelo	Capparis odoratissima	7,5	10,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,47	0,47	0,95
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,61
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,57
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,42	0,42	0,84
Guacamayo	Triplaris americana	7,5	10,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,49	0,49	0,98
Uvero	Coccoloba uvifera	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,58
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,32	0,32	0,63
Naranjuelo	Capparis odoratissima	5,3	7,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,30	0,30	0,61
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,36	0,36	0,72
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Camajon	Sterculia apetala	8,3	11,0	1,49	0,47	0,22	0,24	0,06	0,18	0,60	0,87	0,87	1,75
Santa Cruz	Brosimum utile	9,8	13,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,49	0,49	0,99
Chinito	Nephelium lappaceum	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	12,8	17,0	2,02	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,48	2,48	4,97
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Santa Cruz	Brosimum utile	9,0	12,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,36	0,36	0,71
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,33	0,33	0,66
Almendro	Terminalia catappa	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Matarraton	Gliricidia sepium	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	2,46	2,46	4,92
Guacimo	Guazuma ulmifolia	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
Guacimo	Guazuma ulmifolia	13,5	18,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,19	0,19	0,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	12,0	16,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,31	0,31	0,61
Pepo	Sapindus saponaria	5,3	7,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,8	9,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,43	0,43	0,87
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	3,8	5,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	10,5	14,0	1,88	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	1,77	1,77	3,54
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,44
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	4,5	6,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,34
Pepo	Sapindus saponaria	5,3	7,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	6,8	9,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,61
Trupillo	Prosopis juliflora	4,5	6,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,25
Mamon	Melicoccus bijugatus	4,5	6,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Matarraton	Gliricidia sepium	5,3	7,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,39
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Matarraton	Gliricidia sepium	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	1,79	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	1,72	1,72	3,44
Jobo	Pithecellobim dulce	10,5	14,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,35	1,35	2,70
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	15,0	20,0	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	3,28	3,28	6,56
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	10,5	14,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,69	0,69	1,37
Camajon	Sterculia apetala	10,5	14,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,35	1,35	2,70
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	9,8	13,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,81	0,81	1,62
Guacamayo	Triplaris americana	7,5	10,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,27	0,27	0,54
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,65	0,65	1,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,09	0,17
Camajon	Sterculia apetala	11,3	15,0	1,47	0,47	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,16	1,16	2,32
Jobo	Pithecellobim dulce	9,8	13,0	1,63	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,24	1,24	2,47
Camajon	Sterculia apetala	13,5	18,0	1,89	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	2,30	2,30	4,60
Jobo	Pithecellobim dulce	9,8	13,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,19	1,19	2,38
Palma de Vino	Attalea butyracea	8,3	11,0	1,97	0,63	0,39	0,31	0,10	0,31	0,60	1,53	1,53	3,06
TOTAL												623,94	1247,88

- En relacion al área utilizada en el proceso de aprovechamiento forestal se define que el total de esta es de **0.075** Hectáreas dentro del desarrollo del área donde se está definiendo según el área BASAL que tiene cada uno de los individuos encontrados dentro de campo.

SE RECOMIENDA COMO OBLIGACIONES GENERALES:

1. El tiempo máximo para realizar las actividades de aprovechamiento no deberá ser mayor a 4 meses después emitida la resolución.
2. Para llevar a cabo las actividades de tala emplear maquinaria, equipo y herramientas necesarias como motosierra grande, motosierra pequeña, manilas, escaleras metálicas de doble tramo, limas triangulares y redondas, fumigadora, casco y otros elementos de protección

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
NIT. 806.000.327 – 7
Secretaría General

- personal – EPP, conos y cinta para señalización de áreas de trabajo, entre otros necesarios para la ejecución de la actividad teniendo como base la seguridad y salud de operarios.
3. Antes de realizar la tala, es importante y necesario revisar que el árbol no albergue nidos de aves y epífitas, o cerca de la caída del mismo esté ubicada fauna silvestre que pueda verse perjudicada por el impacto de la poda o la tala del árbol. De encontrarse éstos, es necesario y obligatorio la reubicación y el ahuyamiento de la fauna silvestre, briofitas y/o epífitas presentes en el individuo o el lugar de la actividad.
 4. Informar a la CSB por medio escrito vía correo electrónico la fecha y franja horaria en el cual se realizarán las actividades silviculturales (tala o apeo) mínimo ocho días hábiles de anterioridad.
 5. Usar cicatrizante sobre el tocón a fin de evitar posibles afectaciones fitosanitarias por agentes biológicos.
 6. Entregar un informe a la Autoridad Ambiental, máximo 30 días calendario después de la ejecución de la actividad de tala donde se agregue registro fotográfico previo a la intervención donde se evidencie cada individuo a intervenir debidamente marcado conforme al inventario presentado además de las actividades realizadas

RECOMENDACIONES SOBRE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

1. Se picarán los troncos y ramas de gran tamaño que no se aprovechen, facilitando la degradación de los mismos en el sitio de aprovechamiento.
2. Los pequeños trozos de material vegetal como follaje y ramas pequeñas se podrán dispersar en áreas suelos circundantes.

RECOMENDACIONES PARA COMPROMISOS SOBRE COMPENSACIÓN FORESTAL:

1. Se realizarán actividades de reposición forestal mediante la entrega de plántulas a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, en una relación de 10 plántulas por cada individuo a intervenir, para los 1.595 árboles talados en zona de APAG.
2. Las plántulas deberán tener una altura mínima de entre los 50 a 80 centímetros aproximadamente, en sus respectivas bolsas de vivero calibre 5" *7".
3. El 100 % de los individuos a reponer (15.595 individuos) que serán entregados (15) días luego de entregada la resolución de aprovechamiento por parte de la CAR. El total de estos deberán ser individuos forestales nativos que den riqueza ecosistémica al entorno.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General



FUNDAMENTO JURÍDICO:

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"* Así mismo, el artículo 79 de la Carta Política indica que: *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo"*.

Que el artículo 80 ibidem, establece que: *"El Estado planificará manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución"*.

Que la protección al Medio Ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Así mismo, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 determina cuales son las funciones propias de estas Corporaciones, de las cuales podemos destacar:

"(...)

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (...)"

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

El artículo 2.2.1.1.1.1. Del Decreto 1076 de 2015 define el aprovechamiento forestal, *“como la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. (Decreto 1791 de 1996, Art 1).”*

El artículo 2.2.1.1.9.1. Del Decreto 1076 de 2015 indica que *“cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en territorio de dominio público o en predio de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. (Decreto 1791 de 1996 Art.55).”*

El artículo 2.2.1.1.9.2, de la norma ibídem que *“si se trata de Arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios. (Decreto 1791 de 1996 Art 56).”*

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

En mérito de lo expuesto la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar Aprovechamiento Forestal de mil quinientos noventa y cinco (1.595) Árboles Aislados con un volumen de 1247.88 m³ al CONSORCIO CONSTRU VÍAS identificado con NIT 901.715.685-2, ubicados desde las coordenadas punto No. 1 inicio de la obra: **N** 8.5940, **W** 73.8521 y punto No. 2 final : **N** 8.6006, **W** 74.0163, a lo largo de la vía desde el Municipio de Río Viejo - Bolívar hasta el kilómetro 20 de la vía que conduce al Municipio de Tiquisio - Bolívar, con las siguientes especificaciones:

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA VIA DESDE EL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ALT COM	ALT TOT	CAP m	DAP m	DAP^2	RADIO	RADIO^2	AREA BASAL	FACT FORM	VOL MAD Mt3	VOL COM Mt3	VOL TOTAL Mt3
Higo amarillo	Albizia guachepele	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Mora	Maclura tinctoria	11,3	15,0	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,89	0,89	1,79
Roble	Tabebuia rosea	13,5	18,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,58	2,58	5,16
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,90	0,90	1,81
Roble	Tabebuia rosea	11,3	15,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,99	0,99	1,99
Ceiba Toluá	Pachira quinata	11,3	15,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,48	0,48	0,97
Solera	Cordia alliodora	15,0	20,0	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	1,51	1,51	3,01
Camajón	Sterculia apetala	13,5	18,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,65	1,65	3,30
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	9,0	12,0	2,66	0,85	0,72	0,42	0,18	0,56	0,60	3,04	3,04	6,08
Campano	Samanea saman	12,8	17,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,56	1,56	3,12
Totumo	Crescentia cujete	6,8	9,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,54	0,54	1,09
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	9,0	12,0	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	1,97	1,97	3,94
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Ceiba Toluá	Pachira quinata	11,3	15,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,50	1,50	3,00
Ceiba Toluá	Pachira quinata	9,8	13,0	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	5,70	5,70	11,41
Roble	Tabebuia rosea	11,3	15,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,50	1,50	3,00
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,69	0,69	1,39
Ceiba Toluá	Pachira quinata	12,0	16,0	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	5,16	5,16	10,31
Campano	Samanea saman	9,0	12,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Roble	Tabebuia rosea	5,3	7,0	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,64	0,64	1,29
Teca	Tectona grandis	10,5	14,0	2,20	0,70	0,49	0,35	0,12	0,39	0,60	2,43	2,43	4,85
Teca	Tectona grandis	11,3	15,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,91	0,91	1,82
Teca	Tectona grandis	7,5	10,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,92	0,92	1,83
Guacamayo	Triplaris americana	15,0	20,0	1,79	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	2,29	2,29	4,59
Ceiba Toluá	Pachira quinata	13,5	18,0	3,10	0,99	0,97	0,49	0,24	0,76	0,60	6,19	6,19	12,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,44
Teca	Tectona grandis	10,5	14,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,9	6,5	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	9,0	12,0	1,87	0,60	0,35	0,30	0,09	0,28	0,60	1,50	1,50	3,01
Roble	Tabebuia rosea	13,5	18,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	1,25	1,25	2,49
Ceiba Toluá	Pachira quinata	9,0	12,0	1,83	0,58	0,34	0,29	0,08	0,27	0,60	1,44	1,44	2,88
Roble	Tabebuia rosea	15,0	20,0	1,86	0,59	0,35	0,30	0,09	0,28	0,60	2,48	2,48	4,96
Campano	Samanea saman	18,8	25,0	1,55	0,49	0,24	0,25	0,06	0,19	0,60	2,15	2,15	4,30
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,12	0,12	0,23
Ceiba Toluá	Pachira quinata	12,0	16,0	3,42	1,09	1,19	0,54	0,30	0,93	0,60	6,70	6,70	13,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,33	0,33	0,66
Ceiba Toluá	Pachira quinata	3,8	5,0	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,0	6,6	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,23	0,23	0,46

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	2,19	0,70	0,49	0,35	0,12	0,38	0,60	2,40	2,40	4,81
Campano	<i>Samanea saman</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	2,88	0,92	0,84	0,46	0,21	0,66	0,60	4,16	4,16	8,32
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	4,83	4,83	9,67
Teca	<i>Tectona grandis</i>	10,5	14,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,40	0,40	0,79
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	11,3	15,0	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	6,58	6,58	13,16
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	9,8	13,0	2,58	0,82	0,67	0,41	0,17	0,53	0,60	3,10	3,10	6,20
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	9,8	13,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,85	0,85	1,70
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	11,3	15,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,12	0,12	0,25
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	0,88	0,88	1,76
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,07	0,07	0,14
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	11,3	15,0	3,20	1,02	1,04	0,51	0,26	0,81	0,60	5,50	5,50	11,00
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	1,65	1,65	3,30
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Teca	<i>Tectona grandis</i>	18,8	25,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,84	0,84	1,68
Teca	<i>Tectona grandis</i>	14,3	19,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,72	2,72	5,44
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,65	0,53	0,28	0,26	0,07	0,22	0,60	1,17	1,17	2,34
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	10,5	14,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Teca	<i>Tectona grandis</i>	6,0	8,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,39
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	0,83	0,83	1,66
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	18,8	25,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	1,63	1,63	3,26
Campano	<i>Samanea saman</i>	20,3	27,0	1,56	0,50	0,25	0,25	0,06	0,19	0,60	2,35	2,35	4,71
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,72	0,72	1,43
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	3,8	5,0	0,22	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	7,5	10,0	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,64	0,64	1,29
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	7,5	10,0	3,00	0,95	0,91	0,48	0,23	0,72	0,60	3,22	3,22	6,45
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	11,3	15,0	2,03	0,65	0,42	0,32	0,10	0,33	0,60	2,21	2,21	4,43
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	20,3	27,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,87	0,87	1,75
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	13,5	18,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,19	0,19	0,39
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	6,0	8,0	1,73	0,55	0,30	0,28	0,08	0,24	0,60	0,86	0,86	1,71
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,65	0,53	0,28	0,26	0,07	0,22	0,60	0,97	0,97	1,95
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,46	0,46	0,91
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	13,4	17,8	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,79	0,79	1,57
Vora	<i>Maclura tinctoria</i>	10,5	14,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,72	0,72	1,44
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	13,5	18,0	2,50	0,80	0,63	0,40	0,16	0,50	0,60	4,03	4,03	8,06

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Campano	Samanea saman	12,8	17,0	2,95	0,94	0,88	0,47	0,22	0,69	0,60	5,30	5,30	10,60
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacamayo	Triplaris americana	11,3	15,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,09	0,09	0,17
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	18,8	25,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	1,08	1,08	2,17
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	18,8	25,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	1,29	1,29	2,58
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Uvero	Coccoloba uvifera	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,44
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	2,10	0,67	0,45	0,33	0,11	0,35	0,60	1,26	1,26	2,53
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,43	0,43	0,87
Teca	Tectona grandis	13,5	18,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,52	0,52	1,04
Teca	Tectona grandis	3,8	5,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,20
Ceiba Tolua	Pachira quinata	9,0	12,0	1,62	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,13	1,13	2,26
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,96	0,62	0,39	0,31	0,10	0,31	0,60	1,65	1,65	3,30
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,69	0,69	1,39
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,41	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,00	1,00	1,99
Mora	Maclura tinctoria	12,0	16,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,47	1,47	2,93
Teca	Tectona grandis	7,5	10,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,32	0,32	0,63
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	15,0	20,0	3,50	1,11	1,24	0,56	0,31	0,97	0,60	8,77	8,77	17,55
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,05	1,05	2,09
Guacamayo	Triplaris americana	3,0	4,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,81	1,61
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,29	0,58
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	Pithecellobim dulce	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	Pithecellobim dulce	8,3	11,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,8	9,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,53	0,53	1,06
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,35	0,35	0,70
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,56
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,13
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Campano	Samanea saman	7,5	10,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,00	1,00	2,00
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	1,89	1,89	3,79
Mora	Maclura tinctoria	15,0	20,0	1,47	0,47	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,55	1,55	3,10
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,52	0,52	1,03
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Guacamayo	Triplaris americana	12,8	17,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,60	0,60	1,19
Ceiba Tolua	Pachira quinata	12,8	17,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,56	1,56	3,12
Mora	Maclura tinctoria	12,0	16,0	1,84	0,59	0,34	0,29	0,09	0,27	0,60	1,94	1,94	3,88
Mora	Maclura tinctoria	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Teca	Tectona grandis	9,8	13,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,63	0,63	1,25
Suan	Ficus dendrocida	7,5	10,0	3,40	1,08	1,17	0,54	0,29	0,92	0,60	4,14	4,14	8,28
Payande	Pithecellobim sp	7,5	10,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	Cratagus mongyna	9,0	12,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,46	0,93
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,70	0,70	1,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Mora	Maclura tinctoria	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	Cratagus mongyna	4,5	6,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Roble	Tabebuia rosea	7,5	10,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,40	0,80
Payande	Pithecellobim sp	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
olla de mono	Iecythis lanceolata	4,5	6,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,55	0,55	1,10
Roble	Tabebuia rosea	7,5	10,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,81	1,61
Teca	Tectona grandis	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
olla de mono	Iecythis lanceolata	3,8	5,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	Guazuma ulmifolia	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,45
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	1,85	0,59	0,35	0,29	0,09	0,27	0,60	0,98	0,98	1,96
olla de mono	Iecythis lanceolata	7,5	10,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Payande	Pithecellobim sp	4,5	6,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,15
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,22	0,22	0,43
Payande	Pithecellobim sp	7,5	10,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,53	0,53	1,07
Campano	Samanea saman	11,3	15,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,41	0,41	0,81
Mora	Maclura tinctoria	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	2,50	2,50	4,99
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,35	0,35	0,70
Mora	Maclura tinctoria	6,8	9,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,52	0,52	1,04
Payande	Pithecellobim sp	6,0	8,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,39
Mora	Maclura tinctoria	3,8	5,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	3,23	3,23	6,46
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,46
olla de mono	Iecythis lanceolata	9,0	12,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,36	0,36	0,73
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,90	0,90	1,80
Campano	Samanea saman	22,5	30,0	3,04	0,97	0,94	0,48	0,23	0,74	0,60	9,93	9,93	19,86
Payande	Pithecellobim sp	7,5	10,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Payande	<i>Pithecellobim sp</i>	6,8	9,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,14	0,14	0,27
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	2,3	3,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,40	0,40	0,80
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	2,16	0,69	0,47	0,34	0,12	0,37	0,60	2,34	2,34	4,68
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7,5	10,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,40	0,80
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	10,5	14,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,66	0,66	1,33
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	3,0	4,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6,0	8,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,61
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	10,5	14,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,45	0,45	0,90
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	11,3	15,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,61	0,61	1,23
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	2,80	0,89	0,79	0,45	0,20	0,62	0,60	1,97	1,97	3,93
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2,3	3,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,07	0,07	0,13
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	2,26	0,72	0,52	0,36	0,13	0,41	0,60	2,74	2,74	5,49
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	6,0	8,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,77	0,77	1,54
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,55
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	10,5	14,0	2,04	0,65	0,42	0,32	0,11	0,33	0,60	2,09	2,09	4,17
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	13,5	18,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,45	1,45	2,90
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	3,0	4,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,8	9,0	3,86	1,23	1,51	0,61	0,38	1,19	0,60	4,80	4,80	9,60
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,8	9,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,41	0,41	0,82
Campano	<i>Samanea saman</i>	12,8	17,0	2,72	0,87	0,75	0,43	0,19	0,59	0,60	4,50	4,50	9,01
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	9,0	12,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,79	0,79	1,59
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,62	1,62	3,25
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,47	0,47	0,95
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	9,0	12,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,37	0,37	0,74
Campano	<i>Samanea saman</i>	15,0	20,0	1,87	0,60	0,35	0,30	0,09	0,28	0,60	2,50	2,50	5,01
Campano	<i>Samanea saman</i>	11,3	15,0	2,80	0,89	0,79	0,45	0,20	0,62	0,60	4,21	4,21	8,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	2,65	2,65	5,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,16	0,16	0,32
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	6,8	9,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,45
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,12	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,01
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	3,0	4,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	1,52	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,58	0,58	1,16
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Campano	<i>Samanea saman</i>	4,5	6,0	1,46	0,46	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	0,46	0,46	0,92
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,9	6,5	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,63	0,63	1,25
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	7,5	10,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,8	5,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,0	4,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	11,3	15,0	2,18	0,69	0,48	0,35	0,12	0,38	0,60	2,55	2,55	5,11
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11,3	15,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,70	0,70	1,40
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10,5	14,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,60	0,60	1,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	3,8	5,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,9	6,5	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	0,54	0,54	1,09
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	1,49	0,47	0,22	0,24	0,06	0,18	0,60	0,40	0,40	0,80
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Jobo	<i>Pithecellobium dulce</i>	11,3	15,0	1,41	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,07	1,07	2,14
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,8	13,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,21	0,21	0,42
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	2,3	3,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,07	0,07	0,14
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,48
Naranjuelo	<i>Capparis odoratissima</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,8	9,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,63	1,26
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	16,5	22,0	2,76	0,88	0,77	0,44	0,19	0,61	0,60	6,00	6,00	12,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	15,0	20,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,40	1,40	2,81
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,0	12,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,79	0,79	1,59
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,87	0,87	1,75
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,51
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,50
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,3	7,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Campano	Samanea saman	16,5	22,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	4,54	4,54	9,08
Espino	Cratagus mongyna	10,5	14,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,33	0,33	0,66
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,29
Espino	Cratagus mongyna	6,8	9,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,50
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,25	0,25	0,50
Espino	Cratagus mongyna	13,5	18,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,52	0,52	1,04
Espino	Cratagus mongyna	17,3	23,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,40	0,40	0,81
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,09	0,09	0,17
Espino	Cratagus mongyna	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,17	0,17	0,35
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Espino	Cratagus mongyna	8,3	11,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,46	0,92
Campano	Samanea saman	9,0	12,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,26	0,26	0,52
Espino	Cratagus mongyna	3,8	5,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,26	0,26	0,53
Uvero	Coccoloba uvifera	5,3	7,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,34	0,34	0,68
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	6,0	8,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,41	0,83
Cañandonga	Cassia grandis	9,0	12,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,33	0,33	0,65
Payande	Pithecellobim sp	4,5	6,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,23	0,39	0,15	0,20	0,04	0,12	0,60	0,76	0,76	1,52
Mora	Maclura tinctoria	9,8	13,0	1,19	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,66	0,66	1,32
Mora	Maclura tinctoria	9,0	12,0	1,18	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,60	0,60	1,20
Payande	Pithecellobim sp	8,3	11,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,57
Guacimo	Guazuma ulmifolia	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	1,20	1,20	2,41
Guacamayo	Triplaris americana	18,8	25,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	1,33	1,33	2,66
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,23	0,45
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,11
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,48
Espino	Cratagus mongyna	11,3	15,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,23	0,45
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,59
Espino	Cratagus mongyna	15,0	20,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,72	0,72	1,43
Espino	Cratagus mongyna	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
Espino	Cratagus mongyna	9,0	12,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,21
Espino	Cratagus mongyna	12,0	16,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,36	0,36	0,72
Espino	Cratagus mongyna	13,5	18,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,38	0,38	0,76
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Espino	Cratagus mongyna	5,3	7,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,38
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	1,29	1,29	2,59
Payande	Pithecellobim sp	3,8	5,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Palma de Vino	Attalea butyracea	4,5	6,0	1,31	0,42	0,17	0,21	0,04	0,14	0,60	0,37	0,37	0,74
Espino	Cratagus mongyna	8,3	11,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	1,14	1,14	2,28
Palma de Vino	Attalea butyracea	3,8	5,0	1,34	0,43	0,18	0,21	0,05	0,14	0,60	0,32	0,32	0,64
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	10,5	14,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,81	0,81	1,62
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Espino	Cratagus mongyna	6,8	9,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Campano	Samanea saman	9,0	12,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	1,72	1,72	3,44
Guacamayo	Triplaris americana	10,5	14,0	2,10	0,67	0,45	0,33	0,11	0,35	0,60	2,21	2,21	4,42
Palma de Vino	Attalea butyracea	6,0	8,0	1,52	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,66	0,66	1,32
Palma de Vino	Attalea butyracea	6,0	8,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,77	0,77	1,54
Uvero	Coccoloba uvifera	3,8	5,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,20	0,20	0,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Campano	Samanea saman	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Uvero	Coccoloba uvifera	2,3	3,0	1,57	0,50	0,25	0,25	0,06	0,20	0,60	0,26	0,26	0,53
Cañandonga	Cassia grandis	7,5	10,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	0,69	0,69	1,38
Uvero	Coccoloba uvifera	1,5	2,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	0,41	0,41	0,83
Roble	Tabebuia rosea	9,0	12,0	1,25	0,40	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	0,67	0,67	1,34
Campano	Samanea saman	7,5	10,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,16	1,16	2,32
Uvero	Coccoloba uvifera	3,8	5,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,21	0,21	0,42
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,31	0,31	0,62
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Camajon	Sterculia apetala	9,0	12,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	1,72	1,72	3,44
Uvero	Coccoloba uvifera	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,21	1,21	2,42
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,8	9,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañandonga	Cassia grandis	12,0	16,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,60	0,60	1,19
Cañandonga	Cassia grandis	13,5	18,0	1,25	0,40	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	1,01	1,01	2,01
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,62	0,62	1,25
Campano	Samanea saman	11,3	15,0	2,80	0,89	0,79	0,45	0,20	0,62	0,60	4,21	4,21	8,42
Cañandonga	Cassia grandis	9,0	12,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,70	0,70	1,41
Uvero	Coccoloba uvifera	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	Guazuma ulmifolia	9,0	12,0	1,38	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,82	0,82	1,64
Campano	Samanea saman	10,5	14,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,62	1,62	3,25
Campano	Samanea saman	17,3	23,0	2,94	0,94	0,88	0,47	0,22	0,69	0,60	7,12	7,12	14,24
Palma de Vino	Attalea butyracea	6,0	8,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,43	0,43	0,85
Naranjuelo	Capparis odoratissima	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Campano	Samanea saman	13,5	18,0	2,16	0,69	0,47	0,34	0,12	0,37	0,60	3,01	3,01	6,01
Palma de Vino	Attalea butyracea	6,0	8,0	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,60	0,60	1,20
Palma de Vino	Attalea butyracea	6,0	8,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,64	0,64	1,29

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	8,3	11,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,53	0,53	1,07
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,10	1,10	2,20
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	16,9	22,5	4,04	1,29	1,65	0,64	0,41	1,30	0,60	13,15	13,15	26,30
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,25	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,1	5,5	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	0,52	0,52	1,03
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,42	0,45	0,20	0,23	0,05	0,16	0,60	0,87	0,87	1,73
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	4,5	6,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,48	0,48	0,97
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	0,52	0,52	1,03
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,8	9,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	6,8	9,0	2,50	0,80	0,63	0,40	0,16	0,50	0,60	2,01	2,01	4,03
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8,3	11,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,48	0,48	0,95
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	2,3	3,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,43
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,30
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	4,5	6,0	1,70	0,54	0,29	0,27	0,07	0,23	0,60	0,62	0,62	1,24
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,46	0,46	0,92
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	3,8	5,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	0,58	0,58	1,16
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	9,8	13,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,69	0,69	1,39
Campano	<i>Samanea saman</i>	10,5	14,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,01	2,01	4,01
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,20	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,01
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,30
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,78	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	0,91	0,91	1,82
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Palma de Vino	<i>Attalea butyracea</i>	6,0	8,0	1,92	0,61	0,37	0,31	0,09	0,29	0,60	1,06	1,06	2,11
Payande	<i>Pithecellobium sp</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Campano	<i>Samanea saman</i>	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Campano	<i>Samanea saman</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Campano	Samanea saman	5,3	7,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Payande	Pithecellobim sp	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,36
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Uvero	Coccoloba uvifera	2,3	3,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
cañandonga	Cassia grandis	4,5	6,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Cañandonga	Cassia grandis	5,3	7,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,21	0,21	0,42
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Cañandonga	Cassia grandis	5,3	7,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Cañandonga	Cassia grandis	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Roble	Tabebuia rosea	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Uvero	Coccoloba uvifera	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,73
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Jobo	Pithecellobim dulce	8,3	11,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,49	0,49	0,97
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Jobo	Pithecellobim dulce	12,0	16,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,54	1,54	3,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,39	0,39	0,79
Guacimo	Guazuma ulmifolia	8,3	11,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,17	0,17	0,34
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,27
Mora	Maclura tinctoria	3,0	4,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Mora	Maclura tinctoria	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Espino	Cratagus mongyna	3,0	4,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Uvero	Coccoloba uvifera	2,3	3,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Campano	Samanea saman	6,0	8,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,23
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Campano	Samanea saman	7,5	10,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,34	0,34	0,69
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Cañandonga	Cassia grandis	9,0	12,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,38	0,38	0,76
Uvero	Coccoloba uvifera	6,8	9,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Roble	Tabebuia rosea	7,5	10,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,59	0,59	1,17
Pimiento	Schinus molle	2,3	3,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañandonga	Cassia grandis	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Totumo	Crescentia cujete	3,8	5,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Uvero	Coccoloba uvifera	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Mora	Maclura tinctoria	4,5	6,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Uvero	Coccoloba uvifera	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañandonga	Cassia grandis	2,3	3,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,11	0,11	0,21
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,27
Pepo	Sapindus saponaria	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Roble	Tabebuia rosea	9,0	12,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,32	0,32	0,64
Guarumo	Cecropia peltata	3,0	4,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Campano	Samanea saman	11,3	15,0	3,40	1,08	1,17	0,54	0,29	0,92	0,60	6,21	6,21	12,42
Mora	Maclura tinctoria	7,5	10,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Cañandonga	Cassia grandis	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Guamo	Inga edulis	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Orejero	Enterolobium cyclocarpum	6,8	9,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,34	0,34	0,67
Payande	Pithecellobim sp	3,0	4,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,26	0,26	0,52
Guamo	Inga edulis	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03		0,00	0,00	0,00
Uvero	Coccoloba uvifera	6,0	8,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Guamo	Inga edulis	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Mora	Maclura tinctoria	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Mora	Maclura tinctoria	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Pepo	Sapindus saponaria	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañandonga	Cassia grandis	10,5	14,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,13	1,13	2,26
Payande	Pithecellobim sp	2,3	3,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,07	0,07	0,14
Guamo	Inga edulis	7,5	10,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,49
Guamo	Inga edulis	9,0	12,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,13	0,13	0,27
Guamo	Inga edulis	7,5	10,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Cañandonga	Cassia grandis	15,0	20,0	1,75	0,56	0,31	0,28	0,08	0,24	0,60	2,19	2,19	4,39
Guamo	Inga edulis	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	Guazuma ulmifolia	8,3	11,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,22	0,22	0,44
Fruta pava	Spondias mombin	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Guamo	Inga edulis	11,3	15,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,34	0,34	0,67
Vara Blanca	Casearia corybosa	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Campano	Samanea saman	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	3,8	5,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Guamo	<i>Inga edulis</i>	5,3	7,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Guamo	<i>Inga edulis</i>	5,3	7,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Guamo	<i>Inga edulis</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Guamo	<i>Inga edulis</i>	6,8	9,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,38
Guamo	<i>Inga edulis</i>	4,5	6,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,0	12,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,50	0,50	1,00
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,29
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,24	0,24	0,48
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	10,5	14,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,69	0,69	1,37
Guamo	<i>Inga edulis</i>	7,5	10,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,53
Guamo	<i>Inga edulis</i>	6,8	9,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,28	0,28	0,56
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	15,0	20,0	1,31	0,42	0,17	0,21	0,04	0,14	0,60	1,23	1,23	2,46
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,39	1,39	2,78
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,74	0,74	1,48
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,39	0,39	0,77
Campano	<i>Samanea saman</i>	12,0	16,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,28	0,28	0,56
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
olla de mono	<i>lecythis lanceolata</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Uvero	<i>Coccoloba uvifera</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	20,3	27,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,38	0,38	0,77
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,44	0,44	0,87
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,32	0,32	0,64
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	12,0	16,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,23	0,23	0,45
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	12,0	16,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,72	0,72	1,44
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	15,0	20,0	1,38	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	1,36	1,36	2,73
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,46
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,0	4,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,12
Campano	<i>Samanea saman</i>	9,8	13,0	1,44	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,97	0,97	1,93
Campano	<i>Samanea saman</i>	6,8	9,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,48
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,72	0,72	1,44
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	12,0	16,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,37	0,37	0,73
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,8	5,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,19	0,19	0,39
Campano	<i>Samanea saman</i>	15,0	20,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	1,40	1,40	2,81

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,16	0,16	0,32
Lechoso	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,44
Lechoso	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Mango	<i>Mangifera indica</i>	6,0	8,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,55
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	4,5	6,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	5,3	7,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,56	0,56	1,13
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	2,3	3,0	0,37	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,0	4,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,15
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	6,0	8,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,19	0,19	0,38
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	2,3	3,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,0	8,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,31
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,27
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,31	0,31	0,62
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,29
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,47
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,52	0,52	1,04
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,65	0,65	1,30
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,22	0,22	0,43
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,27	0,27	0,53
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,45
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	4,5	6,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,36	0,36	0,72
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,20
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	9,8	13,0	2,00	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	1,86	1,86	3,72
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,27	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,65	0,65	1,30
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Algarrobo	<i>Ceratonía silíqua</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11,3	15,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,34	0,34	0,69
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10,5	14,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,18	0,18	0,36
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	10,5	14,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,41	0,41	0,81
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	8,3	11,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,16	0,16	0,32
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	0,88	0,88	1,76
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,29	0,58
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	2,3	3,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,40	0,40	0,80
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,8	5,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Algarrobo	<i>Ceratonia siliqua</i>	3,8	5,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	7,5	10,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,53
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	7,5	10,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,34	0,34	0,67
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6,8	9,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,46	0,46	0,93
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,55
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,19	0,19	0,38
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,51
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6,8	9,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,29	0,29	0,58

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Sangregado	<i>Croton sp</i>	9,0	12,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,53	0,53	1,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Sangregado	<i>Croton sp</i>	9,0	12,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,36	0,36	0,71
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,22	0,22	0,44
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,8	9,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Lechoso	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,0	8,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,54	0,54	1,08
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,0	8,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,43
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,8	9,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	7,5	10,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,73
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,66	0,66	1,33
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,24	0,24	0,48
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,24	0,24	0,48
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	12,0	16,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,64	0,64	1,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,36	0,36	0,71
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,34	0,34	0,67
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	7,5	10,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,55
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	5,3	7,0	0,29	0,09	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,39
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,8	13,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,20	0,20	0,39
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	11,3	15,0	1,54	0,49	0,24	0,25	0,06	0,19	0,60	1,27	1,27	2,55
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,33	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,76	0,76	1,52
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	8,3	11,0	1,21	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,58	0,58	1,15

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,27
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,58
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	1,21	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,52	0,52	1,05
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,0	4,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,29
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,0	4,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,53
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,53
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	3,8	5,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,24	0,24	0,48
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,38	1,38	2,75
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Sangregado	<i>Croton sp</i>	7,5	10,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,41	0,41	0,82
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,19
Suan	<i>Ficus dendrocida</i>	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,33
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	7,5	10,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,28	0,28	0,57
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	9,0	12,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,41
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,03	0,03	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,41
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,46	0,46	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	0,76	0,76	1,53
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,27	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	6,0	8,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,19	0,19	0,37
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	11,3	15,0	1,36	0,43	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,99	0,99	1,99
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	10,5	14,0	1,19	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,71	0,71	1,42
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	9,0	12,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,43	0,43	0,86
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	10,5	14,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,56	0,56	1,13
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	10,5	14,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,40	0,40	0,79
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,14	0,14	0,29
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	9,0	12,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,51
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	7,5	10,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,49
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,41
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,8	5,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,84	0,84	1,68
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,0	4,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,14	0,14	0,29
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,51
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,6	7,5	1,45	0,46	0,21	0,23	0,05	0,17	0,60	0,56	0,56	1,13
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	2,3	3,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,05
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	5,3	7,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,27
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Abeto	<i>Abies alba</i>	5,3	7,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,38
Abeto	<i>Abies alba</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,0	8,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,44
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,0	8,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,34	0,34	0,67
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	9,0	12,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	9,0	12,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,8	9,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,31	0,31	0,62
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,59	0,59	1,18
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,84	0,84	1,68
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,62	0,62	1,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,8	13,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,87	0,87	1,75
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	12,0	16,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,83	0,83	1,65
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	1,03	1,03	2,07
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,8	13,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,57	0,57	1,15
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	13,5	18,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	1,06	1,06	2,11
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11,3	15,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,77	0,77	1,55
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	10,5	14,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,63	0,63	1,26
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	8,3	11,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	13,5	18,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,93	0,93	1,86
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,43	0,43	0,87
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	8,3	11,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,52	0,52	1,04
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,8	13,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,91	0,91	1,82
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	7,5	10,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,16	1,16	2,32
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	9,0	12,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,55	0,55	1,10
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,25	0,40	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	0,56	0,56	1,12
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,35	0,35	0,69
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,36	0,36	0,73
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	2,40	0,76	0,58	0,38	0,15	0,46	0,60	3,09	3,09	6,19
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	4,5	6,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,19	0,19	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,36	0,36	0,72
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,28	0,41	0,17	0,20	0,04	0,13	0,60	0,53	0,53	1,06
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,39	0,39	0,78

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,44	0,44	0,88
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	6,8	9,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,54	0,54	1,09
Vara Blanca	<i>Casearia corybosa</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,20	0,20	0,40
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,42	0,42	0,85
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,44	0,44	0,88
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	6,0	8,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,70	0,70	1,40
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,54	0,54	1,09
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,11	0,11	0,22
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	7,5	10,0	1,50	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	0,81	0,81	1,61
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,48	0,48	0,97
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,36
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,8	9,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,63	1,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,0	8,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,41	0,83
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,0	8,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,25	0,25	0,50
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,56	0,56	1,12
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,8	9,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,63	0,63	1,26
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	1,62	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	0,94	0,94	1,88
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,0	4,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,05	0,05	0,10
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	5,3	7,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	3,0	4,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,19	0,19	0,39
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Mora	<i>Maclura tinctoria</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	3,0	4,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	6,8	9,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	2,3	3,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	2,3	3,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,04
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Sangregado	Croton sp	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
ceiba tolua	Pachira quinata	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
ceiba tolua	Pachira quinata	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	Handroanthus chrysanthus	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuate	Handroanthus chrysanthus	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	Pithecellobim dulce	2,3	3,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,03	0,03	0,06
Guarumo	Cecropia peltata	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	Pithecellobim dulce	3,8	5,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	Brosimum utile	6,8	9,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,15
Papayote	Cochlospermum vitifolium	3,8	5,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Cañandonga	Cassia grandis	3,0	4,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,07	0,07	0,15
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañandonga	Cassia grandis	7,5	10,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,06	0,06	0,12
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,04
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	Pithecellobim dulce	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Jobo	Pithecellobim dulce	3,8	5,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,22	0,22	0,45
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,52
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	4,5	6,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobium dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	6,8	9,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,32
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,19	0,19	0,37
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,42	0,42	0,84
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,8	5,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,10	0,10	0,21
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,27
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,31
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	9,0	12,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,64	0,64	1,28
Cañahuat	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Algarrobo	<i>Ceratonía siliqua</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Algarrobo	<i>Ceratonía siliqua</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,39	1,39	2,78
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,51	0,51	1,02
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	0,8	1,0	0,81	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,02	0,02	0,05
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	10,5	14,0	1,40	0,45	0,20	0,22	0,05	0,16	0,60	0,98	0,98	1,97
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	6,0	8,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,41
Sangregado	<i>Croton sp</i>	9,0	12,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,73	0,73	1,45
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Spondias mombin</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9,0	12,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,46	0,46	0,91
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,35
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	9,0	12,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,48	0,48	0,97
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Sangregado	<i>Croton sp</i>	0,5	0,7	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,1	1,5	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,01	0,01	0,02

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Sangregado	Croton sp	7,5	10,0	1,24	0,39	0,16	0,20	0,04	0,12	0,60	0,55	0,55	1,10
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	6,0	8,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	6,0	8,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,22	0,22	0,44
Papayote	Cochlospermum vitifolium	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Gusanero	Astronium graveolens	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,29	0,09	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,25	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Espino	Cratagus mongyna	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,09
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,0	4,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Ceiba tola	Pachira quinata	4,5	6,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,23	0,23	0,46
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,53
Papayote	Cochlospermum vitifolium	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,27
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Papayote	Cochlospermum vitifolium	7,5	10,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,15	0,15	0,30
Santa Cruz	Brosimum utile	6,8	9,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Sangregado	Croton sp	6,0	8,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,16	0,16	0,31
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,16	0,16	0,31
Santa Cruz	Brosimum utile	9,0	12,0	0,74	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,24	0,24	0,47
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,25	0,25	0,49
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,25	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	2,3	3,0	0,33	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,0	4,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,25	0,25	0,51
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,37
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,46
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,59
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Bocachino	<i>Coccoloba acuminata</i>	4,5	6,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Bocachino	<i>Coccoloba acuminata</i>	5,3	7,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,8	9,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	9,0	12,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,18	0,18	0,35
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,10
Pepo	<i>Sapindus saponaria</i>	6,8	9,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,8	9,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,58
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,25	0,25	0,50
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	9,0	12,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,35	0,35	0,70
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,40	0,40	0,79
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	6,8	9,0	1,18	0,38	0,14	0,19	0,04	0,11	0,60	0,45	0,45	0,90
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	7,5	10,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,31	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,8	9,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,05	0,05	0,09
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,26	0,08	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,24	0,08	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,03
Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	6,0	8,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,37	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	7,5	10,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,38	0,12	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	9,0	12,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,18	0,18	0,36
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,61	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Bocachino	<i>Coccoloba acuminata</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,28	0,09	0,01	0,04	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Mamon	<i>Melicoccus bijugatus</i>	15,0	20,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,58	0,58	1,16
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	16,5	22,0	2,08	0,66	0,44	0,33	0,11	0,34	0,60	3,41	3,41	6,82
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,26	0,26	0,52
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,22	0,22	0,44
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,8	9,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,34
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	3,0	4,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,06	0,06	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,25	0,25	0,51
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,01
Camajon	<i>Sterculia apetala</i>	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	5,3	7,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,25	0,25	0,50
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	6,0	8,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,46
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	6,0	8,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,29
Totumo	<i>Crescentia cujete</i>	3,8	5,0	0,23	0,07	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,01	0,01	0,02
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,05
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,15
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,49
Uvita	<i>Cordia alba</i>	6,0	8,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7,5	10,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,19
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	8,3	11,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,43	0,43	0,87
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	5,3	7,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	6,0	8,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,42
Trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	7,5	10,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,17	0,17	0,33
Trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Vara Blanca	<i>Casearia corybosa</i>	4,5	6,0	0,30	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,0	4,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Almendro	<i>Terminalia catappa</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,18
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Coquillo	<i>Lecythis minor</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1,5	2,0	0,10	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Algarrobo	<i>Ceratonia siliqua</i>	6,0	8,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,17	0,17	0,33
Algarrobo	<i>Ceratonia siliqua</i>	6,8	9,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,0	4,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	5,3	7,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	4,5	6,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,21
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,16
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5,3	7,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,21	0,21	0,42
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Trupillo	<i>Prosopis juliflora</i>	3,0	4,0	0,34	0,11	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,32	0,10	0,01	0,05	0,00	0,01	0,60	0,01	0,01	0,03
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,56	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,13
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	5,3	7,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,37
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,07
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	3,8	5,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,03	0,03	0,07

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,0	4,0	0,41	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,05
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	4,5	6,0	0,57	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,07	0,07	0,14
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,54	0,49	0,24	0,25	0,06	0,19	0,60	0,68	0,68	1,36
Bolombolo	<i>Andira inermis</i>	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	2,3	3,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,02	0,02	0,05
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,09	0,09	0,17
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Sangregado	<i>Croton sp</i>	4,5	6,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,20	0,20	0,40
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,90	0,60	0,37	0,30	0,09	0,29	0,60	0,90	0,90	1,81
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,8	9,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,25	0,25	0,50
Ceiba Tolua	<i>Pachira quinata</i>	4,5	6,0	0,64	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,12	0,12	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,12	0,12	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,23
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	3,8	5,0	0,35	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,02	0,02	0,04
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	7,5	10,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,54	0,17	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,08	0,08	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	5,3	7,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,09
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	4,5	6,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Sangregado	<i>Croton sp</i>	10,5	14,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,32	0,32	0,64
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,15
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	6,0	8,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,52	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Sangregado	<i>Croton sp</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Sangregado	Croton sp	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Sangregado	Croton sp	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Sangregado	Croton sp	5,3	7,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,26	0,26	0,51
Sangregado	Croton sp	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Espino	Cratagus mongyna	4,5	6,0	0,39	0,12	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Palma de Vino	Attalea butyracea	7,5	10,0	1,88	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	1,27	1,27	2,53
Guarumo	Cecropia peltata	5,3	7,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	Cecropia peltata	6,0	8,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,41
Chinito	Nephelium lappaceum	4,5	6,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,19
Chinito	Nephelium lappaceum	3,8	5,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Chinito	Nephelium lappaceum	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Espino	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,46
Espino	Cratagus mongyna	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Guacamayo	Triplaris americana	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,42	0,13	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	11,3	15,0	1,38	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	1,02	1,02	2,05
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,51	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,11
Sangregado	Croton sp	5,3	7,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,41
Sangregado	Croton sp	6,8	9,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,41	0,41	0,82
Sangregado	Croton sp	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,77	0,77	1,55
Sangregado	Croton sp	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Sangregado	Croton sp	10,5	14,0	1,80	0,57	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	1,62	1,62	3,25
Sangregado	Croton sp	13,5	18,0	1,26	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	1,02	1,02	2,05
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,46
Espino	Cratagus mongyna	10,5	14,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,61	0,61	1,21
Espino	Cratagus mongyna	7,5	10,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,18	0,18	0,35
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	6,8	9,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,48
Muñeco	Cordia eriostigma	4,5	6,0	0,47	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Muñeco	Cordia eriostigma	4,5	6,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,10
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,13
Jobo	Pithecellobim dulce	7,5	10,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,38	0,38	0,76
Papayote	Cochlospermum vitifolium	6,8	9,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,39
Papayote	Cochlospermum vitifolium	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Papayote	Cochlospermum vitifolium	5,3	7,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Papayote	Cochlospermum vitifolium	6,0	8,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,15	0,15	0,31
Guarumo	Cecropia peltata	6,8	9,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,13	0,13	0,26
Caimito	Pouteria caimito	6,8	9,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,61
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,61
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,42	0,42	0,84
Palma Africana	Elaeis guineensis	5,3	7,0	1,59	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	0,63	0,63	1,27

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	1,94	0,62	0,38	0,31	0,10	0,30	0,60	0,81	0,81	1,62
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	2,06	0,66	0,43	0,33	0,11	0,34	0,60	0,91	0,91	1,82
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	2,02	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	0,88	0,88	1,75
Guamo	<i>Inga edulis</i>	5,3	7,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	5,3	7,0	2,30	0,73	0,54	0,37	0,13	0,42	0,60	1,33	1,33	2,65
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,55
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	5,3	7,0	0,76	0,24	0,06	0,12	0,01	0,05	0,60	0,14	0,14	0,29
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,46	0,46	0,92
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,53	0,17	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,06	0,06	0,12
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	5,3	7,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,36
Buche de gallina	<i>Hasseltia floribunda</i>	4,5	6,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	3,8	5,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,08	0,08	0,17
Muñeco	<i>Cordia eriostigma</i>	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,46	0,46	0,93
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,39	0,44	0,20	0,22	0,05	0,15	0,60	0,62	0,62	1,25
Caimito	<i>Pouteria caimito</i>	5,3	7,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,36
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,41
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,41
Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	10,5	14,0	1,83	0,58	0,34	0,29	0,08	0,27	0,60	1,68	1,68	3,36
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,39	0,39	0,77
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	5,3	7,0	0,36	0,11	0,01	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,06	0,34	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,32	0,32	0,64
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,23	0,23	0,46
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,26	0,26	0,52
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	4,5	6,0	1,88	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	0,76	0,76	1,52
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,25	0,25	0,50
Sangregado	<i>Croton sp</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Apayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	6,0	8,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,37	0,37	0,74
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35
Apayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,83	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,8	9,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,52	0,52	1,04
Sangregado	<i>Croton sp</i>	3,8	5,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,06
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Apayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,13	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,32	0,32	0,64
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,22	0,22	0,45
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,46	0,46	0,92
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,25	0,25	0,49
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,14	0,14	0,28
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	5,3	7,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,25
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,48	0,48	0,97
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,41	0,41	0,83
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,39	0,39	0,78
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	10,5	14,0	1,84	0,59	0,34	0,29	0,09	0,27	0,60	1,70	1,70	3,39
Cañahuate	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	4,5	6,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,26
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,60
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,25	0,25	0,50
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,81	0,58	0,33	0,29	0,08	0,26	0,60	0,94	0,94	1,88
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,34
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	6,0	8,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,35	0,35	0,69
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7,5	10,0	1,11	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,44	0,44	0,88
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	11,3	15,0	2,05	0,65	0,43	0,33	0,11	0,33	0,60	2,26	2,26	4,51
Cañandonga	<i>Cassia grandis</i>	9,0	12,0	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	1,01	1,01	2,01
Espino	<i>Cratagus mongyna</i>	7,5	10,0	1,29	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,60	0,60	1,19
Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	4,5	6,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,35
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Sangregado	<i>Croton sp</i>	12,0	16,0	1,52	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,32	1,32	2,65
Gusanero	<i>Astronium graveolens</i>	9,0	12,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,57	0,57	1,14
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	6,8	9,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,24	0,24	0,49
Ceiba amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	5,3	7,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	6,8	9,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,61
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	14,3	19,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	1,15	1,15	2,30
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	10,5	14,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,81	0,81	1,62
Guacamayo	<i>Triplaris americana</i>	4,5	6,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,27
Papayote	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Santa Cruz	<i>Brosimum utile</i>	3,8	5,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,09	0,18
Ceiba Amarilla	<i>Ceiba pentandra</i>	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Campano	<i>Samanea saman</i>	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,31
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	7,5	10,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,41	0,41	0,82
Jobo	<i>Pithecellobim dulce</i>	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Guacimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,24	0,24	0,48
Balso	Ochroma pyramidale	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Guarumo	Cecropia peltata	4,5	6,0	0,71	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,75
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,39
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	1,46	0,46	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,14	1,14	2,29
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,23
Jobo	Pithecellobim dulce	10,5	14,0	1,77	0,56	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	1,57	1,57	3,14
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,27	0,27	0,54
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	0,99	0,32	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,28	0,28	0,56
Trupillo	Prosopis juliflora	4,5	6,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Trupillo	Prosopis juliflora	6,0	8,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,54	0,54	1,08
Campano	Samanea saman	13,5	18,0	2,10	0,67	0,45	0,33	0,11	0,35	0,60	2,84	2,84	5,69
Jobo	Pithecellobim dulce	12,0	16,0	1,51	0,48	0,23	0,24	0,06	0,18	0,60	1,31	1,31	2,61
Jobo	Pithecellobim dulce	12,8	17,0	1,83	0,58	0,34	0,29	0,08	0,27	0,60	2,04	2,04	4,08
Jobo	Pithecellobim dulce	7,5	10,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,41	0,41	0,82
Cañandonga	Cassia grandis	6,8	9,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,36	0,36	0,72
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Esposito	Cratagus mongyna	9,0	12,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,47	0,47	0,95
Campano	Samanea saman	12,8	17,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,47	0,47	0,94
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,63	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,10	0,10	0,20
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Esposito	Cratagus mongyna	11,3	15,0	1,94	0,62	0,38	0,31	0,10	0,30	0,60	2,02	2,02	4,04
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,61	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Jobo	Pithecellobim dulce	9,0	12,0	1,37	0,44	0,19	0,22	0,05	0,15	0,60	0,81	0,81	1,61
Jobo	Pithecellobim dulce	7,5	10,0	1,27	0,40	0,16	0,20	0,04	0,13	0,60	0,58	0,58	1,16
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,43	0,43	0,85
Omelo	Citrus maxima	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,40
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,17
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,31
Amajon	Sterculia apetala	12,0	16,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	1,17	1,17	2,34
Amajon	Sterculia apetala	13,5	18,0	2,04	0,65	0,42	0,32	0,11	0,33	0,60	2,68	2,68	5,36
Yiba Tolua	Pachira quinata	11,3	15,0	1,42	0,45	0,20	0,23	0,05	0,16	0,60	1,08	1,08	2,17
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Yiba amarilla	Ceiba pentandra	6,8	9,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,32	0,32	0,64
Esposito	Cratagus mongyna	6,0	8,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,48
Jobo	Pithecellobim dulce	4,5	6,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,15
Santero	Astronium graveolens	5,3	7,0	0,84	0,27	0,07	0,13	0,02	0,06	0,60	0,18	0,18	0,35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	9,0	12,0	1,20	0,38	0,15	0,19	0,04	0,11	0,60	0,62	0,62	1,24
Papayote	Cochlospermum vitifolium	9,0	12,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,20	0,20	0,40
Caimito	Pouteria caimito	7,5	10,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,75
Muñeco	Cordia eriostigma	7,5	10,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,38	0,38	0,76
Guarumo	Cecropia peltata	13,5	18,0	1,43	0,46	0,21	0,23	0,05	0,16	0,60	1,32	1,32	2,64
Jobo	Pithecellobim dulce	9,0	12,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,16	1,16	2,31
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,98	0,31	0,10	0,16	0,02	0,08	0,60	0,34	0,34	0,69
Santa Cruz	Brosimum utile	10,5	14,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,38	0,38	0,76
Santa Cruz	Brosimum utile	8,3	11,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,59	0,59	1,17
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,21
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,86	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,21	0,21	0,42
Jobo	Pithecellobim dulce	9,0	12,0	1,42	0,45	0,20	0,23	0,05	0,16	0,60	0,87	0,87	1,73
Santa Cruz	Brosimum utile	4,5	6,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,24	0,24	0,48
Santa Cruz	Brosimum utile	12,8	17,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,48	0,48	0,96
Santa Cruz	Brosimum utile	6,0	8,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,45
Guacamayo	Triplaris americana	7,5	10,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,45	0,45	0,90
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Totumo	Crescentia cujete	2,3	3,0	0,62	0,20	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,04	0,04	0,08
Santa Cruz	Brosimum utile	5,3	7,0	0,93	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,43
Santa Cruz	Brosimum utile	6,8	9,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,33	0,33	0,66
Jobo	Pithecellobim dulce	9,8	13,0	1,53	0,49	0,24	0,24	0,06	0,19	0,60	1,09	1,09	2,18
Trebol	Platymiscium pinnatum	7,5	10,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,61	0,61	1,21
Santa Cruz	Brosimum utile	10,5	14,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,60	0,60	1,19
Sangregado	Croton sp	6,8	9,0	0,92	0,29	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,27	0,27	0,55
Totumillo de Monte	Amphitecna sp	6,0	8,0	1,04	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,31	0,31	0,62
Trebol	Platymiscium pinnatum	8,3	11,0	1,30	0,41	0,17	0,21	0,04	0,13	0,60	0,67	0,67	1,33
Buche de gallina	Hasseltia floribunda	6,0	8,0	0,90	0,29	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,23	0,23	0,46
Buche de gallina	Hasseltia floribunda	5,3	7,0	0,60	0,19	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,18
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	4,5	6,0	0,50	0,16	0,03	0,08	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,11
Trebol	Platymiscium pinnatum	7,5	10,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,23	0,23	0,46
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	5,3	7,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,30
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	6,0	8,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,18	0,18	0,36
Buche de gallina	Hasseltia floribunda	3,8	5,0	0,45	0,14	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,07
Jobo	Pithecellobim dulce	10,5	14,0	1,67	0,53	0,28	0,27	0,07	0,22	0,60	1,40	1,40	2,80
Cañahuat	Handroanthus chrysanthus	5,3	7,0	0,58	0,18	0,03	0,09	0,01	0,03	0,60	0,08	0,08	0,16
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,67	0,21	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,22
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,68	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,10	0,10	0,20

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,82	0,26	0,07	0,13	0,02	0,05	0,60	0,17	0,17	0,34
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,21
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,26	0,26	0,52
Guarumo	Cecropia peltata	7,5	10,0	1,02	0,32	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,37	0,37	0,75
Totumillo de Monte	Amphitecna sp	4,5	6,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,44	0,14	0,02	0,07	0,00	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,09	0,35	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,34	0,34	0,68
Sangregado	Croton sp	11,3	15,0	2,60	0,83	0,68	0,41	0,17	0,54	0,60	3,63	3,63	7,26
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,39	0,39	0,78
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,44	0,44	0,88
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,22	0,39	0,15	0,19	0,04	0,12	0,60	0,48	0,48	0,96
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,78	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,15	0,15	0,31
Guacamayo	Triplaris americana	11,3	15,0	1,72	0,55	0,30	0,27	0,07	0,24	0,60	1,59	1,59	3,18
Ceiba amarilla	Ceiba pentandra	14,3	19,0	2,12	0,67	0,46	0,34	0,11	0,36	0,60	3,06	3,06	6,12
Varanjuelo	Capparis odoratissima	7,5	10,0	1,15	0,37	0,13	0,18	0,03	0,11	0,60	0,47	0,47	0,95
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,30	0,30	0,61
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,00	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,57
Jobo	Pithecellobim dulce	6,8	9,0	1,14	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,42	0,42	0,84
Guacamayo	Triplaris americana	7,5	10,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,49	0,49	0,98
Ivero	Coccoloba uvifera	6,0	8,0	0,49	0,16	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,07	0,07	0,14
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,01	0,32	0,10	0,16	0,03	0,08	0,60	0,29	0,29	0,58
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,05	0,33	0,11	0,17	0,03	0,09	0,60	0,32	0,32	0,63
Ilanjuelo	Capparis odoratissima	5,3	7,0	1,10	0,35	0,12	0,18	0,03	0,10	0,60	0,30	0,30	0,61
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,20	0,20	0,40
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	0,70	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,14	0,14	0,28
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,12	0,36	0,13	0,18	0,03	0,10	0,60	0,36	0,36	0,72
Jobo	Pithecellobim dulce	6,0	8,0	1,07	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,66
Samajon	Sterculia apetala	8,3	11,0	1,49	0,47	0,22	0,24	0,06	0,18	0,60	0,87	0,87	1,75
Santa Cruz	Brosimum utile	9,8	13,0	1,03	0,33	0,11	0,16	0,03	0,08	0,60	0,49	0,49	0,99
Chinito	Nephelium lappaceum	5,3	7,0	0,40	0,13	0,02	0,06	0,00	0,01	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	12,8	17,0	2,02	0,64	0,41	0,32	0,10	0,32	0,60	2,48	2,48	4,97
Santa Cruz	Brosimum utile	7,5	10,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,21	0,21	0,42
Santa Cruz	Brosimum utile	9,0	12,0	0,91	0,29	0,08	0,14	0,02	0,07	0,60	0,36	0,36	0,71
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	0,96	0,31	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,33	0,33	0,66
Imendro	Terminalia catappa	4,5	6,0	0,75	0,24	0,06	0,12	0,01	0,04	0,60	0,12	0,12	0,24
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,85	0,27	0,07	0,14	0,02	0,06	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,11	0,11	0,23
Matarraton	Gliricidia sepium	3,8	5,0	0,48	0,15	0,02	0,08	0,01	0,02	0,60	0,04	0,04	0,08
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	2,46	2,46	4,92
Guacimo	Guazuma ulmifolia	9,8	13,0	0,95	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,42	0,42	0,84
Guacimo	Guazuma ulmifolia	13,5	18,0	0,55	0,18	0,03	0,09	0,01	0,02	0,60	0,19	0,19	0,39
Guacimo	Guazuma ulmifolia	12,0	16,0	0,73	0,23	0,05	0,12	0,01	0,04	0,60	0,31	0,31	0,61
epo	Sapindus saponaria	5,3	7,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,11	0,11	0,22

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,8	9,0	1,16	0,37	0,14	0,18	0,03	0,11	0,60	0,43	0,43	0,87
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	3,8	5,0	0,43	0,14	0,02	0,07	0,00	0,01	0,60	0,03	0,03	0,07
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	10,5	14,0	1,88	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	1,77	1,77	3,54
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	6,0	8,0	0,65	0,21	0,04	0,10	0,01	0,03	0,60	0,12	0,12	0,24
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,59	0,19	0,04	0,09	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,17
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	5,3	7,0	0,94	0,30	0,09	0,15	0,02	0,07	0,60	0,22	0,22	0,44
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	4,5	6,0	0,89	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,17	0,17	0,34
Pepo	Sapindus saponaria	5,3	7,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,24	0,24	0,47
Guacimo	Guazuma ulmifolia	6,0	8,0	1,08	0,34	0,12	0,17	0,03	0,09	0,60	0,33	0,33	0,67
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	6,8	9,0	0,97	0,31	0,10	0,15	0,02	0,07	0,60	0,30	0,30	0,61
Trupillo	Prosopis juliflora	4,5	6,0	0,77	0,25	0,06	0,12	0,02	0,05	0,60	0,13	0,13	0,25
Mamon	Melicoccus bijugatus	4,5	6,0	0,46	0,15	0,02	0,07	0,01	0,02	0,60	0,05	0,05	0,09
Mataraton	Gliricidia sepium	5,3	7,0	0,88	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,19	0,19	0,39
Jobo	Pithecellobim dulce	5,3	7,0	0,72	0,23	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,13	0,13	0,26
Mataraton	Gliricidia sepium	5,3	7,0	0,80	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,32
Jobo	Pithecellobim dulce	11,3	15,0	1,79	0,57	0,32	0,28	0,08	0,25	0,60	1,72	1,72	3,44
Jobo	Pithecellobim dulce	10,5	14,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,35	1,35	2,70
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	15,0	20,0	2,14	0,68	0,46	0,34	0,12	0,36	0,60	3,28	3,28	6,56
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	10,5	14,0	1,17	0,37	0,14	0,19	0,03	0,11	0,60	0,69	0,69	1,37
Camajon	Sterculia apetala	10,5	14,0	1,64	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,35	1,35	2,70
Ceiba Amarilla	Ceiba pentandra	9,8	13,0	1,32	0,42	0,18	0,21	0,04	0,14	0,60	0,81	0,81	1,62
Guacamayo	Triplaris americana	7,5	10,0	0,87	0,28	0,08	0,14	0,02	0,06	0,60	0,27	0,27	0,54
Guacimo	Guazuma ulmifolia	5,3	7,0	0,79	0,25	0,06	0,13	0,02	0,05	0,60	0,16	0,16	0,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	4,5	6,0	0,66	0,21	0,04	0,11	0,01	0,03	0,60	0,09	0,09	0,19
Guacimo	Guazuma ulmifolia	7,5	10,0	1,35	0,43	0,18	0,21	0,05	0,15	0,60	0,65	0,65	1,31
Guacimo	Guazuma ulmifolia	3,8	5,0	0,69	0,22	0,05	0,11	0,01	0,04	0,60	0,09	0,09	0,17
Camajon	Sterculia apetala	11,3	15,0	1,47	0,47	0,22	0,23	0,05	0,17	0,60	1,16	1,16	2,32
Jobo	Pithecellobim dulce	9,8	13,0	1,63	0,52	0,27	0,26	0,07	0,21	0,60	1,24	1,24	2,47
Camajon	Sterculia apetala	13,5	18,0	1,89	0,60	0,36	0,30	0,09	0,28	0,60	2,30	2,30	4,60
Jobo	Pithecellobim dulce	9,8	13,0	1,60	0,51	0,26	0,25	0,06	0,20	0,60	1,19	1,19	2,38
Palma de Vino	Attalea butyracea	8,3	11,0	1,97	0,63	0,39	0,31	0,10	0,31	0,60	1,53	1,53	3,06
TOTAL												623,94	1247,8

PARÁGRAFO: Que el CONSORCIO CONSTRU VIAS identificado con NIT. 901.715.685, tendrá cuatro (04) meses para realizar el Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados de las especies forestales anteriormente mencionadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el CONSORCIO CONSTRU VIAS identificado con NIT. 901.715.685, deberá hacer entrega a la CSB la cantidad de quince mil quinientos noventa y cinco (15.595) árboles nativos que den riqueza ecosistémica al entorno.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

PARÁGRAFO PRIMERO: La entrega de los árboles se realizará bajo la supervisión de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CSB mediante la respectiva acta de entrega de las especies anteriormente mencionadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los árboles de que trata el Artículo Segundo deben ser puestos a disposición de esta CAR el mismo día de la notificación del Acto Administrativo que otorga el permiso en cuestión, estas especies deberán tener una altura mínima entre los 50 a 80 centímetros, en sus respectivas bolsas de vivero calibre 5"x7" pulgadas.

ARTÍCULO TERCERO: La Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados estará condicionado al cumplimiento estricto de las siguientes obligaciones:

1. Para llevar a cabo las actividades de tala emplear maquinaria, equipo y herramientas necesarias como motosierra grande, motosierra pequeña, manilas, escaleras metálicas de doble tramo, limas triangulares y redondas, fumigadora, casco y otros elementos de protección personal – EPP, conos y cinta para señalización de áreas de trabajo, entre otros necesarios para la ejecución de la actividad teniendo como base la seguridad y salud de operarios.
2. Antes de realizar la tala, es importante y necesario revisar que el árbol no albergue nidos de aves y epífitas, o cerca de la caída del mismo esté ubicada fauna silvestre que pueda verse perjudicada por el impacto de la poda o la tala del árbol. De encontrarse éstos, es necesario y obligatorio la reubicación y el ahuyamiento de la fauna silvestre, briofitas y/o epífitas presentes en el individuo o el lugar de la actividad.
3. Informar a la CSB por medio escrito vía correo electrónico la fecha y franja horaria en el cual se realizarán las actividades silviculturales (tala o apeo) mínimo ocho días hábiles de anterioridad.
4. Usar cicatrizante sobre el tocón a fin de evitar posibles afectaciones fitosanitarias por agentes biológicos.
5. Entregar un informe a la Autoridad Ambiental, máximo 30 días calendario después de la ejecución de la actividad de tala donde se agregue registro fotográfico previo a la intervención donde se evidencie cada individuo a intervenir debidamente marcado conforme al inventario presentado además de las actividades realizadas
6. Se picarán los troncos y ramas de gran tamaño que no se aprovechen, facilitando la degradación de los mismos en el sitio de aprovechamiento.
7. Los pequeños trozos de material vegetal como follaje y ramas pequeñas se podrán dispersar en áreas suelos circundantes.

ARTÍCULO CUARTO: La CSB podrá realizar visitas de seguimiento y control Ambiental a la Autorización viabilizada para verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONSORCIO CONSTRU VIAS identificado con NIT. 901.715.685.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente decisión a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Cooperación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, Para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO CONSTRU VIAS identificado con NIT. 901.715.685, debe cancelar a la CSB, el valor del servicio de publicación del encabezado y la parte resolutive del presente proveído, previa facturación que realizara la Subdirección Administrativa y Financiera de la CSB.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente o por aviso según sea el caso, el contenido de la presente decisión al CONSORCIO CONSTRU VIAS identificado con NIT. 901.715.685, conforme a lo estipulado en los artículos 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaria General

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición ante la Directora General de la CSB, conforme a lo establecido en el Artículo 74 y SS., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente Acto Administrativo, de conformidad en el Artículo 71 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



CLAUDIA CABALLERO SUAREZ
Directora General CSB

Exp: 2024 - 036

Proyecto: Elkin Ulloque - Judicante CSB

Reviso: Ana Mejía Mendiivil Secretaria General CSB